herpy

GEKKOER

Ocellated velvet gecko

Oedura monilis

Oedura monilis er en slank, nataktiv klatrer fra det østlige Australien med et mønster af mørke øjepletter og brede tæer, der minder om små sugekopper. Den lever i træer og på klipper, tager villigt foderinsekter og er en rolig, robust gekko for den, der vil prøve slægten *Oedura*.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Oedura ocellata; Oedura attenboroughi* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Savanne, regnskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 30 × 40 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-27 °C**
Hotspot	**29-33 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**3-5**
Inkubation	**55-70 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES eller i EU's bilag til forordning 338/97 (slægten Oedura er ikke blandt de australske slægter på CITES liste III), så der kræves ingen CITES-papirer. Australien tillader ikke udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Spørg altid sælgeren om herkomst og opdrætsbevis, og tjek de aktuelle danske regler hos Fødevarestyrelsen.

Pasning i korte træk

TERRARIET	En enkelt *Oedura monilis*, et par eller en han med to hunner kan holdes i et terrarie på mindst 50 × 30 × 40 cm (længde × bredde × højde). Mere plads er et godt valg.
TEMPERATUR	Giv arten en omgivende temperatur om dagen på omkring 24-27 °C og et varmt sted på 29-33 °C, fx under en lille glødepære, der varmer en korkplade.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Oedura monilis* trives med middel luftfugtighed. Sigt efter 40-60 %. Sprøjt terrariet 3-4 gange om ugen. En vandskål kan bruges, men kan også udelades, når der sprøjtes, så dyrene kan drikke dråber fra vægge og dekorationer.
LYS OG UVB	*Oedura monilis* er nataktiv og har ikke noget kendt behov for UVB, og UVB giver ingen synlig forskel.
FODER	*Oedura monilis* lever af insekter og tager næsten alle foderinsekter i passende størrelse: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, mindre melorme og larver af sorte soldaterfluer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Oedura monilis* er et roligt og skjult dyr, som mest er aktivt efter mørkets frembrud, men det kan af og til ses fremme i dagtimerne. Føler det sig truet, krummer det ryggen og vifter med halen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/oedura-monilis