herpy

GEKKOER

Tiger thick-toed gecko

Pachydactylus tigrinus

En lille, kraftigt bygget klippegekko med tværbånd i brunt og creme, som minder om en tigers tegning. Den lever i savanne og klippeterræn i det sydlige Afrika og er nataktiv. Der findes kun lidt viden om pasningen, så rådene bygger på levested, klima og beslægtede arter.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Pachydactylus capensis tigrinus; Pachydactylus capensis rhodesianus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-11 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Savanne og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Hotspot	**30-33 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**55-75 dage** ved 26-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er hverken opført i CITES eller i EU's forordning om handel med vilde dyr (338/97), så der kræves ingen CITES- eller EU-tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten ses sjældent i handelen, så vælg dyr, der dokumenteret er opdrættet i fangenskab.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Pachydactylus tigrinus*.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 24-28 °C, og under en varmelampe eller på en sten under lampen 30-33 °C. Om natten skal temperaturen falde til 18-22 °C. Der skal altid være en kølig ende, så dyret kan vælge.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten lever i tørt til halvtørt terræn. Hold luftfugtigheden omkring 30-50 %, og forstøv let en gang imellem på bagvæggen om aftenen, så dyret kan drikke dråber. Underlaget skal blive tørt igen i løbet af dagen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og opholder sig i skjul om dagen. UVB er derfor ikke afgørende, når foderet pudres med kalk og D3.
FODER	*Pachydactylus tigrinus* lever af insekter. Fårekyllinger, små dubia-kakerlakker, melorme og græshopper i passende størrelse er et godt grundfoder. Byttet skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Gekkoen er nervøs og hurtig og egner sig bedre til at blive set på end til at blive håndteret. Tag aldrig fat i halen, som kan afkastes. Det sociale liv er ikke dokumenteret hos arten.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Zimbabwe, Sydafrika, Botswana og Mozambique.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/pachydactylus-tigrinus