herpy

GEKKOER

Mocquard's Madagascar ground gecko

Paroedura bastardi

Paroedura bastardi er en mellemstor, jordlevende og nataktiv gekko fra det sydøstlige Madagaskar med kraftige lemmer, et bredt, trekantet hoved og tornede knopper på halen. Den kan klatre på træstammer, men bider let, når den bliver taget op, så den egner sig bedst til dig, der vil kigge mere end håndtere.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Phyllodactylus bastardi* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**29-31 °C**
Temperatur, nat	**21-23 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-10 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**51-65 dage** ved 29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står ikke på CITES-listerne og ikke på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg inden for EU. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav til hold og pasning.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der er kun få erfaringer med *Paroedura bastardi*, så målene bygger på *Paroedura picta*. Et enkelt voksent dyr eller en han med et par hunner kan holdes i et terrarie på mindst 50 × 30 × 30 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR
Tallene bygger på *Paroedura picta*. Om dagen skal der være 25-28 °C i terrariet, og et varmt område kan nå 29-31 °C. Om natten må temperaturen falde til 21-23 °C. Sluk lyset om natten, så døgnrytmen bevares.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Hold luftfugtigheden på omkring 60-70 %. Sprøjt siderne af terrariet let en gang om dagen, så der er dråber at drikke af og fugtigheden stiger. Et hygrometer viser, om det holder.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og tilbringer det meste af dagen skjult. UVB er valgfrit, så længe foderet tilsættes kalk og D3-vitamin. Det er ikke undersøgt, om arten har gavn af UVB, og for *Paroedura picta* anses UVB ikke for nødvendigt.

FODER
Arten spiser insekter. Grundfoderet er fårekyllinger, suppleret af melorme og i mindre mængde voksmøllarver, som er fede og kun hører til som godbid.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Paroedura bastardi og de nære slægtninge i artskomplekset bider hurtigt, når de bliver taget op, formentlig som forsvar.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.