herpy

GEKKOER

Réunion Island day gecko

Phelsuma borbonica

Phelsuma borbonica er en mellemstor, blågrøn daggekko, fra Réunion i Det Indiske Ocean; en underart lever på Agaléga. Den er rødbrunt marmoreret på ryg og hale, trives i fugtige, solrige skovkanter og er truet i naturen. Den skal have et højt, varmt og velplantet terrarie med UVB-lys, og der findes kun lidt viden om pasningen.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Phelsuma cepediana borbonica; Phelsuma agalegae*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**13-16 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt, nektar og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**60-90 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Hele slægten Phelsuma står på CITES liste II og i bilag B i EU's forordning 338/97. Dyr, der indføres fra lande uden for EU, kræver CITES-eksporttilladelse og EU-importtilladelse. Ved køb og salg inden for EU skal sælger kunne dokumentere, at dyret er lovligt erhvervet. Spørg sælgeren om papirerne, og kontrollér de gældende danske regler hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du køber.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Phelsuma borbonica*. Vejledningen bygger på klimaet i levestedet og på de bedre kendte daggekkoer, især *Phelsuma laticauda*, som lever på samme ø.

TEMPERATUR
Phelsuma borbonica skal have 25-28 °C i terrariet om dagen. Under en spotlampe skal der være et varmt sted på 30-32 °C, så dyret kan ligge og varme sig i solen. Om natten skal temperaturen falde til 20-22 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden i terrariet til *Phelsuma borbonica* skal ligge på 60-80 %, med højest værdi om natten og efter forstøvning og et lidt lavere niveau hen over dagen.

LYS OG UVB
Phelsuma borbonica er dagaktiv og meget lysglad og har brug for kraftigt, naturligt lys. Brug et UVB-rør i styrken 5,0, fx et T5-rør, monteret over den ene halvdel af terrariet, så dyret kan vælge mellem lys og skygge.

FODER
Phelsuma borbonica æder insekter, nektar og modent frugtkød. I fangenskab trives den på en blanding af færdigfoder til daggekkoer og levende foderinsekter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Phelsuma borbonica er nervøs og tilbøjelig til at flygte. Dyret bør ikke håndteres, men betragtes. Flugt i panik kan få det til at tabe halen, og halen vokser ikke ud igen i samme form.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Réunion og Mauritius.