herpy

GEKKOER

Peacock day gecko

Phelsuma quadriocellata

Phelsuma quadriocellata er en lille, lysegrøn daggekko fra Madagaskars østkyst, med røde tegn på ryggen og mørke, blåkantede pletter på siderne. Den er dagaktiv og lever højt oppe i grenene, så den passer til et stort, tæt beplantet terrarie, men ikke til håndtering.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Pachydactylus quadriocellatus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**8-15 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter, frugt, nektar og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**3-6**
Inkubation	**42-53 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Alle daggekkoer af slægten Phelsuma står på CITES bilag II og på bilag B i EU's forordning om handel med vilde dyr. Dyr, der indføres fra lande uden for EU, kræver CITES-dokumenter, og ved køb og salg inden for EU bør der følge dokumentation for lovlig herkomst med dyret. Spørg Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, hvis du er i tvivl om reglerne for det enkelte dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et højt terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Højden er vigtig, fordi *Phelsuma quadriocellata* lever oppe i grenene og udnytter al den plads, den får.

TEMPERATUR

Phelsuma quadriocellata skal have en tydelig temperaturgradient. Solpladsen øverst skal være 30-32 °C og den køligere zone nede i terrariet omkring 22 °C. Resten af luften holdes på 22-26 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal ligge på 60-70 %. Det opnås med en fugtbevarende bund, regelmæssig sprøjtning og eventuelt en lille forstøver eller et vandfald.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og har brug for kraftigt lys og UVB. Et T5-rør med 6 % UVB, placeret 30-40 cm over den højeste solplads, giver et UV-indeks på omkring 3-4, svarende til Ferguson-zone 3.

FODER

Phelsuma quadriocellata er altædende og æder i naturen både insekter, nektar og blød frugt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Phelsuma quadriocellata er sky, hurtig og nervøs, og den passer bedst som udstillingsdyr. Den kan ikke vænnes til at blive håndteret. Når den føler sig truet, kan den kaste et stykke af huden.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.