herpy

GEKKOER

## Ringed thin-tail gecko

# *Phyllurus caudiannulatus*

*Phyllurus caudiannulatus* er en lille, nataktiv bladhalegekko fra skovene omkring Bulburin i det centrale østlige Queensland i Australien. Halen er smal og rund med lyse ringe. Arten har en meget lille udbredelse og er næsten truet i naturen.

Familie: Carphodactylidae  Udgivet 16. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **10-11 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Regnskov** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **50 × 50 × 50 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **20-25 °C** |
| Temperatur, nat | **15-19 °C** |
| Luftfugtighed | **55-100 %** |
| UVB | **Ikke nødvendig** |
| Vinterhvile | **10-16 °C**<br>9-13 uger |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **18-36 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **2 æg** |
| Kuld pr. år | **2-4** |
| Inkubation | **90-110 dage**<br>ved 21-25 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Næsten truet (NT)** |

Arten står på CITES liste II (fra 5.3.2026) og i bilag B i EU's forordning 338/97 (fra 29.6.2026). Køb, salg og indførsel kræver dokumentation for lovlig oprindelse; CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Phyllurus caudiannulatus*, så vejledningen bygger på de nære slægtninge *Phyllurus platurus* og *Saltuarius salebrosus*. |
| **TEMPERATUR** | Dagtemperaturen er 20-25 °C og natten 15-19 °C. Tallene er et forsigtigt skøn ud fra *Phyllurus platurus* (22-26 °C om dagen) og *Saltuarius cornutus*, og de er ikke målt for *P. caudiannulatus*. Hold terrariet i den kølige ende. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Sprøjt terrariet grundigt om aftenen, så luftfugtigheden stiger mod 100 %, og lad den falde til omkring 55-60 % mellem sprøjtningerne. I hvileperioden sprøjtes hver aften, så dyrene kan drikke dråberne. |
| **LYS OG UVB** | Arten er nataktiv og lever skjult om dagen, og UVB er ikke nødvendig. Giv terrariet en fast døgnrytme med svagt dagslys og mørke om natten. |
| **FODER** | Arten æder insekter, og almindelige foderinsekter som fårekyllinger og kakerlakker kan bruges. Foderdyrene må højst være på størrelse med dyrets hoved. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Phyllurus caudiannulatus* er en skjult og nataktiv art, som sidder stille på bark om dagen. Den skal ikke håndteres mere end højst nødvendigt, og aldrig i halen, som den smider. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |