herpy

GEKKOER

Ringed thin-tail gecko

Phyllurus caudiannulatus

Phyllurus caudiannulatus er en lille, nataktiv bladhalegekko fra skovene omkring Bulburin i det centrale østlige Queensland i Australien. Halen er smal og rund med lyse ringe. Arten har en meget lille udbredelse og er næsten truet i naturen.

Familie: Carphodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-11 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**15-19 °C**
Luftfugtighed	**55-100 %**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**10-16 °C** 9-13 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**90-110 dage** ved 21-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II (fra 5.3.2026) og i bilag B i EU's forordning 338/97 (fra 29.6.2026). Køb, salg og indførsel kræver dokumentation for lovlig oprindelse; CITES-tilladelser og -certifikater udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Om arten

Phyllurus caudiannulatus er en lille, slank, nataktiv gekko, der bliver omkring 10-11 cm fra snude til kloak. Artsnavnet *caudiannulatus* betyder formentlig "ringhalet" og henviser til de lyse bånd på halen. Slægtsnavnet *Phyllurus* betyder "bladhale", men hos denne art er halen smal og cylindrisk, ikke bred og flad som hos *Phyllurus platurus*. Den lever på træer, har kløer på tæerne og mangler hæftelameller som andre bladhalegekkoer.

Arten blev beskrevet i 1975 og kan være en sammensat art, der dækker flere bestande. Den er vurderet som næsten truet, og den holdes meget sjældent i terrarier.

Udbredelse og levested

Phyllurus caudiannulatus lever kun i et lille område i det centrale østlige Queensland i Australien: Bulburin-området i Dawes Range og Many Peaks Range sydvest for Miriam Vale. Typelokaliteten er Bulburin, omkring 24 km sydvest for Miriam Vale. Fundene ligger samlet mellem omkring 24,2 og 24,8 grader syd og 151,4 og 151,8 grader øst.

Den snævre udbredelse er en del af grunden til, at arten er vurderet som næsten truet.

> **Oprindelig udbredelse:** Australien.

LEVESTED

Phyllurus caudiannulatus er en nataktiv træboer. Bulburin-området rummer den største rest af subtropisk regnskov i det centrale Queensland, og her lever arten. Skovtype, højde over havet og klima på artens egne levesteder er ikke nærmere beskrevet.

Arten lægger æg og æder insekter. Kuldstørrelsen er to æg.

Pasning

TERRARIET

Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Phyllurus caudiannulatus*, så vejledningen bygger på de nære slægtninge *Phyllurus platurus* og *Saltuarius salebrosus*. Målene er lånt fra *P. platurus*: et par holdes i et terrarie på mindst 50 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde). Højde og klatremuligheder er vigtige.

Indret terrariet med lodrette stykker stiv bark og nogle grene, så dyret kan komme rundt. Arten sidder på bark, og skjul på bunden er ikke nødvendige. Som bund kan fugtig kokosfiber eller en tynd blanding af fint sand og kokosmuld bruges. Terrariet skal have god ventilation med åbninger både foroven og forneden. Hunner, der skal lægge, skal have en dyb æglægningsbund (se avl).

TEMPERATUR

Dagtemperaturen er 20-25 °C og natten 15-19 °C. Tallene er et forsigtigt skøn ud fra *Phyllurus platurus* (22-26 °C om dagen) og *Saltuarius cornutus*, og de er ikke målt for *P. caudiannulatus*. Hold terrariet i den kølige ende. Varme er den største risiko for bladhalegekkoer, så placér terrariet i skygge og sprøjt på varme dage.

En kølig hvileperiode hører med til holdet (se avl).

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Sprøjt terrariet grundigt om aftenen, så luftfugtigheden stiger mod 100 %, og lad den falde til omkring 55-60 % mellem sprøjtningerne. I hvileperioden sprøjtes hver aften, så dyrene kan drikke dråberne. Bunden må ikke være konstant våd. Tallene er lånt fra *Phyllurus platurus*.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

LYS OG UVB

Arten er nataktiv og lever skjult om dagen, og UVB er ikke nødvendig. Giv terrariet en fast døgnrytme med svagt dagslys og mørke om natten. Brug ikke stærke spotlamper og ikke farvet natlys, og sørg for skyggefulde partier hele dagen.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Arten æder insekter, og almindelige foderinsekter som fårekyllinger og kakerlakker kan bruges. Foderdyrene må højst være på størrelse med dyrets hoved. Giv to til tre insekter pr. dyr ad gangen, og pudr dem jævnligt med kalk og multivitamin. Fjern rester næste morgen. Halen lagrer fedt og viser dyrets form.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Phyllurus caudiannulatus er en skjult og nataktiv art, som sidder stille på bark om dagen. Den skal ikke håndteres mere end højst nødvendigt, og aldrig i halen, som den smider.

Hold den enkeltvis eller parvis med kun én han pr. terrarie, som de nære slægtninge.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hannerne har en tydelig hemipenis-bule ved halens rod, som hunnerne mangler. Alderen er ikke dokumenteret for *Phyllurus caudiannulatus*. Hos *Phyllurus platurus* sættes dyrene først i avl, når de er mindst 18 måneder gamle, og hos *Saltuarius salebrosus* tager det 3-4 år.

PARRING

Hos nære slægtninge udløses avl af en kølig hvileperiode. Dyrene fodres ikke i en uge, og dagtemperaturen sænkes derefter 2-3 grader om dagen til 10-16 °C. Hvileperioden varer to til tre måneder, og terrariet sprøjtes hver aften. Derefter hæves temperaturen over en uge til normalen. Tag et dyr ud af perioden, hvis det taber mere end få gram. Tallene er lånt fra *Phyllurus platurus*.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger to æg ad gangen. Hos beslægtede arter lægges to til fire kuld pr. sæson med omkring en måneds mellemrum. Hun skal have en 8-10 cm dyb, fugtig bund af tørvemos eller kokosfiber, der klumper, men ikke er våd, og som aldrig må tørre ud. Hun graver en rede, lægger æggene og dækker dem til. Efter lægningen er hun tydeligt tyndere.

INKUBATION

Fjern æggene fra reden, og inkuber dem i en blanding af perlit og vand i forholdet 1:1 efter vægt. Hos *Phyllurus platurus* inkuberes ved 21-22 °C, og over 25 °C kan fostrene dø, så hold dig i den kølige ende. Klækningstiden er ikke dokumenteret for *P. caudiannulatus*; hos slægtninge er den 90-110 dage.

Temperaturens betydning for kønnet er ikke afklaret. Ungerne skifter hud næsten straks efter klækningen.

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne holdes i en lille boks, fx 30 × 20 × 20 cm, med køkkenrulle som bund og et stykke korkbark som skjul. Sprøjt hver anden dag, og tilbyd det første foder to til ti dage efter klækningen. Giv små insekter, ikke større end dyrets hoved, pudret med kalk og multivitamin. Ungerne spiser lidt de første uger og tager derefter godt til. Klækkede søskende kan som regel holdes sammen, men adskil dem, hvis den ene bliver større eller dominerer.

Sundhed og typiske fejl

Der findes ingen dokumenteret sygdomsoversigt for *Phyllurus caudiannulatus*, så listen bygger på de nære slægtninge. De vigtigste risici er:

- For høje temperaturer, især på varme sommerdage. Hold terrariet køligt og i skygge.
- For tør luft, som giver problemer med hudskifte, hvor hudrester sidder fast på tæer og halespids.
- Konstant våd bund og stillestående luft, som giver mug og hudproblemer.
- Kalkmangel, hvis foderet ikke pudres.
- Vægttab i hvileperioden. Tag dyret ud af perioden, og byg det op igen.

Halen viser dyrets form. Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig, ikke spiser eller ser slap ud.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.