herpy

GEKKOER

Southern leaf-tailed gecko

Phyllurus platurus

Phyllurus platurus er en brunmarmoreret, nataktiv bladhalegekko fra sandstensklipperne omkring Sydney. Den brede, bladformede hale og kamuflagen får den til at forsvinde på klippe og bark. Den bliver kun omkring 15 cm, er rolig at holde og skal have en kold vinterpause for at yngle.

Familie: Carphodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 50 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-21 °C**
Luftfugtighed	**55-100 %**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**10-16 °C** 9-13 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**18 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**56-110 dage** ved 21-22 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten står på CITES liste III på Australiens anmodning og på bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. I Australien kræves tilladelse til at holde arten. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par voksne dyr kan holdes i et terrarie på omkring 50 × 50 × 50 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.

TEMPERATUR

Phyllurus platurus trives ved almindelig stuetemperatur. Om dagen skal temperaturen ligge på 22-26 °C, og om natten må den falde til omkring 19-21 °C. Der er ikke dokumenteret behov for et varmt hotspot.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Sprøjt terrariet hver aften med lunkent vand. Lige efter sprøjtningen er luftfugtigheden tæt på 100 %, men mellem sprøjtningerne skal den falde til omkring 55-60 %, så terrariet kan tørre op. Dyrene drikker dråber fra overfladerne.

LYS OG UVB

Der foreligger ingen dokumenterede krav til UVB for arten. Den er nataktiv og gemmer sig om dagen i sprækker, så den får kun lidt lys i naturen.

FODER

Phyllurus platurus tager levende insekter. Jagtstrategien er et baghold, så byttet skal bevæge sig. Fårekyllinger kan bruges som grundfoder; i naturen er det edderkopper, møl, biller og kakerlakker.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten er stille og stedfast og sidder ofte urørlig og godt kamufleret. Den er ikke et dyr, der skal håndteres meget. Tag aldrig fat i halen, for den kastes, og den nye hale bliver glattere og mindre karakteristisk.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Australien.