herpy

GEKKOER

Rüppell's semaphore gecko

Pristurus flavipunctatus

En lille, dagaktiv gekko fra landene omkring den sydlige del af Rødehavet, med en høj, savtakket hale og gule pletter. Den bliver omkring 8 cm lang inklusive hale, og der findes næsten ingen viden om pasningen.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**70-90 dage** ved 28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Lovgivningen i dyrenes hjemlande kan begrænse udførsel af vilde dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Pristurus flavipunctatus*. Pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på *Pristurus carteri*, den bedst kendte art i slægten i terrarier.

TEMPERATUR

Lav en gradient med 28-30 °C i den kølige ende og en solplads på 40-45 °C under en spotlampe. Om natten må temperaturen falde til omkring 20-22 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luften skal være tør, omkring 30-40 %. Giv en meget lav skål med frisk vand, eller læg sten i skålen, så dyret ikke kan drukne, og spray indretningen let en gang om ugen, så dyrene kan drikke dråber.

LYS OG UVB

P. flavipunctatus er dagaktiv og skal have kraftigt dagslys og UVB over solpladsen, fx et T5-rør. Ferguson-zone 3 er et skøn for en dagaktiv ørkengekko; zonen er ikke målt for arten.

FODER

Arten æder små leddyr. Giv springhaler, bananfluer, små fårekyllinger og andre små insekter, ikke bredere end dyrets hoved. Fodr voksne dyr hver anden eller tredje dag og unge dyr dagligt, og fjern resten efter 15-20 minutter.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Pristurus flavipunctatus er hurtig og vagtsom og egner sig ikke til håndtering, og halen kan knække af. Dyrenes adfærd over for hinanden i fangenskab er ikke dokumenteret.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia, Sudan, Sydsudan, Egypten og Saudi-Arabien.