herpy

GEKKOER

Rüppell's semaphore gecko

Pristurus flavipunctatus

En lille, dagaktiv gekko fra landene omkring den sydlige del af Rødehavet, med en høj, savtakket hale og gule pletter. Den bliver omkring 8 cm lang inklusive hale, og der findes næsten ingen viden om pasningen.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Pristurus percristatus; Pristurus gasperetti* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**70-90 dage** ved 28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Lovgivningen i dyrenes hjemlande kan begrænse udførsel af vilde dyr.

Om arten

Pristurus flavipunctatus er en lille gekko med slank krop, lange, tynde ben og en hale, der er længere end hoved og krop, kraftigt sammentrykt fra siderne og har en savtakket køl langs over- og undersiden. Hos hannerne danner den øverste køl en egentlig kam. Oversiden er lyst gråbrun med mere eller mindre tydelige mørkere tværbånd og en mørk stribe gennem øjet. Et målt dyr var 79 mm langt med hale; andre mål for totallængden er ikke fundet, så 7-8 cm i boksen er et skøn.

Arten blev beskrevet af Eduard Rüppell i 1835 fra kysten ved Massawa i Eritrea og er typeart for slægten *Pristurus*. Slægtsnavnet kommer af græsk *pristos*, savet, og *oura*, hale, og artsnavnet af latin *flavus*, gul, efter de gule pletter. Arten skilte sig fra artskomplekset omkring *Pristurus rupestris* for omkring 21 millioner år siden. *P. percristatus* og *P. gasperetti* er i dag synonymer.

Slægtens arter er dagaktive og signalerer med halen og kropsholdningen.

Udbredelse og levested

Pristurus flavipunctatus lever på begge sider af den sydlige del af Rødehavet. På den afrikanske side er den kendt fra Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia, Sudan, Sydsudan (Neberet-dalen) og Egyptens rødehavskyst, og på den arabiske side fra det vestlige Saudi-Arabien, også Farasan-øerne. Typelokaliteten er Massawa i Eritrea. Angivelserne fra Jordan er usikre: dyr fra det sydlige Jordan blev tidligere ført til *P. flavipunctatus*, men regnes i dag til *Pristurus guweirensis*. De indgår ikke i kortet.

Arten har et stort udbredelsesområde og vurderes ikke truet.

> **Oprindelig udbredelse:** Eritrea, Etiopien, Djibouti, Somalia, Sudan, Sydsudan, Egypten og Saudi-Arabien.

LEVESTED

Pristurus flavipunctatus lever i det varme, tørre lavland og de lave bjerge omkring Rødehavet og er fundet op til mindst 460 m over havet. Der falder kun lidt regn, og dagtemperaturerne er høje det meste af året. Levestedet er kun sparsomt beskrevet; slægtens arter lever på jorden, på sten og klipper eller i træer og buske, og dyrene holder sig tæt på skjul. Temperatur og luftfugtighed på levestedet er ikke målt for arten.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

Pasning

TERRARIET

Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Pristurus flavipunctatus*. Pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på *Pristurus carteri*, den bedst kendte art i slægten i terrarier. Tallene for temperatur, levetid og udrugning er lånt fra *P. carteri*.

Et voksent dyr kan holdes i et terrarie på 40 × 30 × 30 cm. Indret med flade sten, skifer og rødder, så der opstår sprækker og solpladser i flere højder, og læg et bundlag af fint sand blandet med jord. Sten skal ligge stabilt og helst limes. Terrariet skal have god ventilation og et tætsluttende låg, for dyret er lille og hurtigt.

TEMPERATUR

Lav en gradient med 28-30 °C i den kølige ende og en solplads på 40-45 °C under en spotlampe. Om natten må temperaturen falde til omkring 20-22 °C. Brug termometre i begge ender og et infrarødt termometer til solpladsen, og styr varmen med termostat. Søger dyret hele tiden skygge, er solpladsen for varm.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luften skal være tør, omkring 30-40 %. Giv en meget lav skål med frisk vand, eller læg sten i skålen, så dyret ikke kan drukne, og spray indretningen let en gang om ugen, så dyrene kan drikke dråber. Fugtighedskravene er ikke undersøgt for arten.

LYS OG UVB

P. flavipunctatus er dagaktiv og skal have kraftigt dagslys og UVB over solpladsen, fx et T5-rør. Ferguson-zone 3 er et skøn for en dagaktiv ørkengekko; zonen er ikke målt for arten. Hav lyset tændt 12 timer om dagen om sommeren og 9-10 timer om vinteren, og skift UVB-røret efter producentens anvisning.

Læs mere: Lys og UVB

FODER

Arten æder små leddyr. Giv springhaler, bananfluer, små fårekyllinger og andre små insekter, ikke bredere end dyrets hoved. Fodr voksne dyr hver anden eller tredje dag og unge dyr dagligt, og fjern resten efter 15-20 minutter. Pudr foderet med kalk og vitaminer ved hver anden fodring. Føden i naturen er ikke undersøgt.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Pristurus flavipunctatus er hurtig og vagtsom og egner sig ikke til håndtering, og halen kan knække af. Dyrenes adfærd over for hinanden i fangenskab er ikke dokumenteret. Hold dem enkeltvis eller som et par i et rummeligt terrarie med mange skjul, og hold aldrig to hanner sammen.

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alder og størrelse ved kønsmodenhed er ikke dokumenteret for *P. flavipunctatus*. Vent med avl, til dyrene er fuldt udvoksede, og hunnen er i god foderstand.

PARRING

Parring i fangenskab er ikke beskrevet for *P. flavipunctatus*. Hannerne i slægten signalerer med halen og med armstrækninger, men hvilken rolle signalerne spiller ved parringen, er ikke undersøgt. Følg den første kontakt, og skil dyrene, hvis hannen jager hunnen vedholdende.

ÆGLÆGNING OG KULD

Hvor mange æg hunnen lægger, og hvor ofte, er ikke dokumenteret for arten; hos slægtens øvrige arter lægges ét hårdskallet æg ad gangen. Hunnen kan gemme sæd, så hun kan lægge befrugtede æg længe efter en parring. Giv hende en lille æglæggekasse med fugtigt sand, og sørg for rigeligt med kalk.

INKUBATION

Udrugningen er ikke dokumenteret for *P. flavipunctatus*, så tallene i boksen (70-90 dage ved 28 °C) er kun en vejledende ramme. Flyt æggene forsigtigt, uden at de vendes, til let fugtig vermiculite, og hold temperaturen jævn.

OPDRÆT AF UNGER

Opdræt af ungerne er ikke dokumenteret. Ungerne er meget små og skal have de allermindste foderdyr, som bananfluer og nyklækkede fårekyllinger, samt kalk og UVB.

Sundhed og typiske fejl

Der er ikke dokumenteret sygdomme, der er specifikke for *Pristurus flavipunctatus* i fangenskab. De typiske fejl for små, dagaktive ørkengekkoer er:

- For lidt UVB og kalk, som kan give bløde knogler og rystelser.
- For høj fugtighed og dårlig ventilation.
- Overophedning under en for kraftig lampe uden køligt område.
- Tabt hale ved stress eller fastholdelse.

Et sundt dyr er hurtigt og vagtsomt med klare øjne. Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig eller ligger slapt.

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.