herpy

GEKKOER

Rock semaphore gecko

Pristurus rupestris

En lille, dagaktiv klippegekko fra Hajar-bjergene i Oman og Irans kyst, der krøller halen op over ryggen og signalerer med den. Den bliver kun 5-7 cm lang inklusive hale, og der findes meget lidt viden om pasningen.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Pristurus rupestris iranicus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**5-7 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**28-30 °C**
Hotspot	**40-45 °C**
Temperatur, nat	**20-22 °C**
Luftfugtighed	**30-40 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**70-90 dage** ved 28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Lovgivningen i dyrenes hjemlande kan begrænse udførsel af vilde dyr.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun meget lidt viden om pasningen af *Pristurus rupestris*. Pasningen bygger på artens levevis, klimaet i udbredelsesområdet og den nært beslægtede *Pristurus carteri*, der stiller samme krav til varme, lys og tørhed.
TEMPERATUR	Lav en gradient med 28-30 °C i den kølige ende og en solplads på 40-45 °C under en lille spotlampe. Om natten må temperaturen falde til omkring 20-22 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være tør, omkring 30-40 %. Giv en meget lav skål med frisk vand, eller læg sten i skålen, så en lille gekko ikke kan drukne.
LYS OG UVB	*P. rupestris* er dagaktiv og soler sig, så den skal have kraftigt dagslys og UVB over solpladsen, fx et T5-rør med lav UVB-andel.
FODER	Arten æder små leddyr. Giv springhaler, bananfluer, nyklækkede fårekyllinger og andre meget små insekter, der ikke er bredere end dyrets hoved.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Pristurus rupestris* er hurtig og vagtsom og egner sig ikke til håndtering, og halen kan knække af, hvis dyret gribes. Arten signalerer med halen og med armstrækninger og viser sig tydeligt i dagtimerne.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Oman og Iran.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/pristurus-rupestris