herpy

GEKKOER

Sinai fan-fingered gecko

Ptyodactylus guttatus

En slank klippegekko med vifteformede tæer og et mønster af mørke og lyse pletter på ryggen. Den lever på klipper og stenmure i Sinai, Negev og nabolandene. Der findes kun lidt viden om pasningen, så mange tal er lånt fra slægten.

Familie: Phyllodactylidae Tidligere navn: *Ptyodactylus gecko; Gecko maculatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-9 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-11 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Klippeboende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 60 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**27-32 °C**
Hotspot	**32-38 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri**
Vinterhvile	**10-21 °C** 8-12 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**5-6**
Inkubation	**45-100 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES og ikke i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb, salg eller flytning inden for EU. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Mange dyr i handlen er vildfangne, så spørg efter dyrets oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Ptyodactylus guttatus*. Pasningen bygger på slægten som helhed, især *Ptyodactylus hasselquistii*, og på klimaet i de varme, tørre klippeegne, hvor arten lever.

TEMPERATUR
Terrariet skal have en tydelig temperaturforskel. Om dagen skal det være 27-32 °C, og under varmelampen skal et sted nå 32-38 °C. Om natten falder temperaturen til 18-22 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Ptyodactylus guttatus kommer fra tørre egne og trives ved lav til moderat luftfugtighed, 30-50 %. Tallet er et skøn. Terrariet skal ikke være vådt, og bunden skal kunne tørre. Forstøv let, så dyret kan drikke dråber fra stenene.

LYS OG UVB
Brug en varmelampe eller spot over en flad sten, så dyret kan sole sig. UVB-behovet er ikke dokumenteret for arten. Et svagt UVB-rør til ørkenarter kan bruges, når der er skygge i resten af terrariet.

FODER
Ptyodactylus guttatus lever af insekter og andre små leddyr. Fårekyllinger, græshopper, melorme og kakerlakker er gode foderdyr, og de skal være mindre end afstanden mellem dyrets øjne.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Ptyodactylus guttatus er hurtig og sky og egner sig ikke til håndtering. Giv den ro til at falde til efter en flytning. Tag aldrig fat i halen, for den kan smides. Arten holdes parvis eller enkeltvis.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Egypten, Israel, De palæstinensiske områder, Syrien, Jordan og Saudi-Arabien.