herpy

GEKKOER

Lesser rough-snouted gecko

Rhacodactylus trachycephalus

Rhacodactylus trachycephalus er en sjælden, nataktiv klatrer fra Île des Pins og den lille ø Môrô i Ny Kaledonien, og den føder levende unger. Arten er kritisk truet i naturen og sjælden i fangenskab. Pasningen minder om de øvrige *Rhacodactylus*-arter, men dyrene er dyre, vokser langsomt og får højst to unger om året.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Chameleonurus trachycephalus; Rhacodactylus trachyrhynchus trachycephalus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H til 4 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**18-21 °C**
Luftfugtighed	**65-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og færdigfoder**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**36-60 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**180 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Kritisk truet (CR)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr. På IUCN's rødliste er den kritisk truet (CR), og den hører til de sjældneste gekkoer i verden. Spørg sælgeren om dyrets afstamning, og køb kun opdrættede dyr med dokumenteret oprindelse. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Arten trives bedst i et lodret terrarie på mindst 45 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde). Det rummer et til fire dyr, og et større terrarie er altid en fordel.
TEMPERATUR	Der er ikke målt præcise temperaturer for *Rhacodactylus trachycephalus* i naturen, så tallene bygger på erfaringer med arten i fangenskab og med beslægtede *Rhacodactylus*-arter. Hele spændvidden ligger mellem 18 og 29 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden bør ligge omkring 65-70 %. Den kan holdes oppe med en levende plante, fugtig sphagnum i et skjul og regelmæssig sprøjtning.
LYS OG UVB	Arten er helt nataktiv og kommer først frem, når der er mørkt. Det er ikke påvist, at UVB er nødvendigt.
FODER	Foderet består af levende insekter og et tørt pollen- og nektarfoder til daggekkoer, som står fremme hele tiden. Giv fire voksne fårekyllinger pr. voksent dyr én gang om ugen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er rolig, og med regelmæssig håndtering bliver dyrene tamme og lige så lette at tage op som *Correlophus ciliatus*. Dyrene er aktive om natten, så håndtér dem om aftenen.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Ny Kaledonien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/rhacodactylus-trachycephalus