herpy

GEKKOER

Rough-snouted giant gecko

Rhacodactylus trachyrhynchus

Rhacodactylus trachyrhynchus er en sjælden, nataktiv træboer fra Ny Kaledonien med ru skæl på snuden og en usædvanlig egenskab: Den føder levende unger, hvilket i slægten kun deles med en enkelt nær slægtning. Arten er sårbar i naturen og kun sjældent set i terrarier, og vejledningen bygger delvis på erfaringer med de nærmeste slægtninge.

Familie: Diplodactylidae Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-38 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**15-20 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-80 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter, frugt og færdigfoder**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kuldstørrelse	**1-2 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**150-240 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning 338/97, så der kræves ingen CITES-papirer. I modsætning til slægtningene *Rhacodactylus leachianus* og *Rhacodactylus auriculatus* står den heller ikke på bilag D. Den er fredet i Ny Kaledoniens nord- og sydprovins, sårbar (VU) på IUCN's rødliste og truet af ulovlig indsamling, så køb kun dyr fra dokumenteret opdræt. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Pasningen af *Rhacodactylus trachyrhynchus* er næsten ukendt, så rådene om pasning er lånt fra den nært beslægtede *Rhacodactylus leachianus* og er et forsigtigt udgangspunkt.

TEMPERATUR

Om dagen er 22-27 °C passende for *Rhacodactylus trachyrhynchus*, og om natten må det falde til 18-22 °C. Et varmested er unødvendigt, fordi arten er nataktiv og hører hjemme i et mildt klima. Varme er den største fare for slægten.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Hold luftfugtigheden for *Rhacodactylus trachyrhynchus* på 50-80 %. Spray terrariet grundigt om aftenen, så den stiger til 70-80 %, og lad den falde igen i løbet af dagen, så bund og grene når at tørre.

LYS OG UVB

Rhacodactylus trachyrhynchus er nataktiv og klarer sig formentlig som slægtens øvrige arter uden UVB, når foderet indeholder D3-vitamin. UVB er derfor valgfrit.

FODER

Rhacodactylus trachyrhynchus er formentlig altædende som alle *Rhacodactylus*-arter, med insekter og frugt som hovedføde og lejlighedsvis små firben, fugleunger og gnavere. En blandet kost er derfor udgangspunktet.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Hannerne af *Rhacodactylus trachyrhynchus* slås ofte, hvis de går sammen, mens hunner er sociale og kan holdes sammen. Hold derfor aldrig to hanner i samme terrarie. En han kan holdes alene eller med en eller to hunner.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Ny Kaledonien.