herpy

GEKKOER

## Western beaked gecko

# *Rhynchoedura ornata*

*Rhynchoedura ornata* er en lille, slank og nataktiv gekko fra de sandede ørkener i det vestlige og centrale Australien. Den har en spids snude med et næbagtigt præg, lever på jorden og æder mest termitter. Der findes næsten ingen viden om pasningen, så vejledningen bygger på levestedet og på slægtninge fra samme egne.

Familie: Diplodactylidae  Tidligere navne: *Diplodactylus paraornatus*  Udgivet 16. november 2026

**SPECIFIKATIONER**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **4-6 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-8 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Ørken og halvørken** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **40 × 25 × 25 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **25-28 °C** |
| Hotspot | **30-34 °C** |
| Temperatur, nat | **16-22 °C** |
| Luftfugtighed | **30-45 %** |
| UVB | **Valgfri**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **10-12 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Inkubation | **46-60 dage**<br>ved 27-29 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står hverken på CITES eller i bilagene til EU's forordning 338/97 (slægten Rhynchoedura er ikke blandt de australske slægter på CITES liste III), så der kræves ingen CITES-papirer. Spørg altid sælgeren om herkomst og opdrætsbevis. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Rhynchoedura ornata*, så anbefalingerne her bygger på levestedet i den australske ørken og på den nært beslægtede *Diplodactylus galeatus*, som bor i samme type landskab.

**TEMPERATUR**
Dagtemperaturen er 25-28 °C, med et varmt sted på 30-34 °C, fx under en lille lampe over en flad sten. Mål altid med et digitalt termometer, for en pæres varme varierer meget.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**
*Rhynchoedura ornata* kommer fra tørre egne og skal holdes tørt: sigt efter 30-45 % luftfugtighed. Terrariet skal ventileres godt, og bunden skal være tør.

**LYS OG UVB**
*Rhynchoedura ornata* er nataktiv og har ikke noget dokumenteret behov for UVB. Giver du UVB alligevel, skal det være et svagt lys (Ferguson-zone 1) med masser af skygge, så gekkoen kan trække sig helt væk.

**FODER**
*Rhynchoedura ornata* lever i naturen mest af termitter og desuden af myrer. Termitter er sjældne som foderdyr, så tilbyd små, bløde foderinsekter: nyklækkede og små fårekyllinger, bananfluer, springhaler og små kakerlakker.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**
*Rhynchoedura ornata* er et roligt, skjult og nataktivt dyr. Om dagen ses det næsten ikke, og om natten kan det ses løbe rundt på sandet på jagt. Det er hurtigt og kan let slippe væk fra hånden, og halen smides ved fare.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**
Australien.