herpy

GEKKOER

Rough-throated leaf-tailed gecko

Saltuarius salebrosus

Saltuarius salebrosus er en stor, nataktiv bladhalegekko fra det mellemøstlige og sydlige Queensland i Australien. Den har en ru strube besat med knopper, hud, der ligner lavbevokset bark, og en bred, bladformet hale. Den tåler mere varme end slægtens andre arter, klarer sig godt i terrarier og er en rolig art for den øvede holder.

Familie: Carphodactylidae Tidligere navn: *Phyllurus salebrosus* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**14 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende og klippeboende**
Biotop	**Tørskov og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 80 cm** L × B × H til 3 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Temperatur, nat	**19-21 °C**
Luftfugtighed	**55-100 %**
UVB	**Ikke nødvendig**
Vinterhvile	**10-16 °C** 9-13 uger
Kost	**Insekter**
Holdes	**Parvis eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**36-48 mdr.**
Kuldstørrelse	**2 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**95-105 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Saltuarius står på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Ved handel over grænser kræves dokumentation efter reglerne for liste III og bilag C. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET
To eller tre dyr kan holdes i et terrarie på 60 × 40 × 80 cm (længde × bredde × højde). Indret det med lodrette stykker stiv bark og nogle grene, så dyrene kan komme rundt i hele terrariet.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen er 22-26 °C og natten 19-21 °C. Tallene er lånt fra *Phyllurus platurus*.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Sprøjt terrariet grundigt 2-3 gange om ugen. Luftfugtigheden stiger efter sprøjtningen mod 100 % og skal så falde til omkring 55-60 %, så bark og bund kan tørre op.

LYS OG UVB
Arten er nataktiv og lever skjult om dagen, og UVB er ikke nødvendig. Giv terrariet en fast døgnrytme med svagt dagslys og mørke om natten.

FODER
Arten tager almindelige foderinsekter som fårekyllinger og kakerlakker. I avlssæsonen fodres tre gange om ugen, og om vinteren kun hver anden til tredje uge.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Saltuarius salebrosus er en rolig og nataktiv art, som sidder stille på bark om dagen. Den stiller få krav, men skal ikke håndteres mere end højst nødvendigt, og aldrig i halen, som den smider.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.