herpy

GEKKOER

Morocco lizard-fingered gecko

Saurodactylus brosseti

Saurodactylus brosseti er en meget lille, jordlevende gekko fra det vestlige Marokko. Kroppen måler omkring 3 cm fra snude til kloak, og den er aktiv om dagen og i skumringen. Arten er et kompleks af skjulte arter og næsten ukendt i fangenskab, så vejledningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**3 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag og skumring**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 30 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**12-18 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Saurodactylus brosseti*. Klimaet i udbredelsesområdet er middelhavsagtigt med varme, tørre somre og milde, fugtigere vintre, og arten er en meget lille, jordlevende gekko.
TEMPERATUR	Om dagen holdes bunden på 22-28 °C med et lille varmested på 30-32 °C under en svag spotlampe styret af en termostat. Om natten falder temperaturen til 12-18 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden på levestederne er ikke dokumenteret; 40-60 % passer til klimaet.
LYS OG UVB	*Saurodactylus brosseti* er aktiv om dagen og i skumringen.
FODER	I naturen lever arten af små leddyr. Foderdyrene skal være meget små, ikke større end dyrets hoved: springhaler, bananfluer, nyklækkede fårekyllinger og små bænkebidere.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten jager som ventejæger: den sidder stille og slår til, når et lille insekt kommer forbi. Adfærden i fangenskab er ikke dokumenteret. Hold dyret enkeltvis eller et par i et rummeligt terrarie med mange skjul.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Marokko.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/saurodactylus-brosseti