herpy

GEKKOER

## Morocco lizard-fingered gecko

# *Saurodactylus brosseti*

*Saurodactylus brosseti* er en meget lille, jordlevende gekko fra det vestlige Marokko. Kroppen måler omkring 3 cm fra snude til kloak, og den er aktiv om dagen og i skumringen. Arten er et kompleks af skjulte arter og næsten ukendt i fangenskab, så vejledningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet.

Familie: Sphaerodactylidae  Tidligere navn: *Saurodactylus mauritanicus brosseti; Saurodactylus fasciatus brosseti*  Udgivet 16. november 2026

**SPECIFIKATIONER**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **3 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Levetid | **5-10 år** |
| Aktiv | **Dag og skumring** |
| Levevis | **Jordboende** |
| Biotop | **Halvørken og klippeterræn** |
| Sværhedsgrad | **Erfaren** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **40 × 30 × 30 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **22-28 °C** |
| Hotspot | **30-32 °C** |
| Temperatur, nat | **12-18 °C** |
| Luftfugtighed | **40-60 %** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 1 |
| Kost | **Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)** |
| Holdes | **Enkeltvis eller parvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kuldstørrelse | **1 æg** |
| Inkubation | **60-90 dage**<br>ved 24-28 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er ikke opført på CITES-listerne eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

## Om arten

*Saurodactylus brosseti* er en meget lille gekko i familien Sphaerodactylidae. Den måler op til omkring 31 mm fra snude til kloak. Rygfarven varierer fra beige til mørkebrun. Arten mangler de store hvide eller gule pletter på ryggen, som andre arter i komplekset har; pletterne er meget små eller helt fraværende. Halen er som regel dækket af uregelmæssige gule pletter på brun bund, og oven på hovedet ses som regel en hvid, V-formet streg, der ikke når ned på halsen.

Arten blev beskrevet i 1957 som underart af *Saurodactylus mauritanicus* og regnes i dag som selvstændig art. Den er opkaldt efter ornitologen og pattedyrforskeren André Brosset, der hjalp med at indsamle dyrene. Genetisk rummer *S. brosseti* i den gamle afgrænsning fem adskilte linjer, som i 2019 blev delt i fem arter: *Saurodactylus brosseti* i snæver forstand (den nordlige linje), *Saurodactylus elmoudenii*, *Saurodactylus harrisii*, *Saurodactylus slimanii* og *Saurodactylus splendidus*. De fleste af linjerne kan ikke skelnes på udseendet, og ældre oplysninger om arten kan derfor gælde hele komplekset.

Arten lægger æg. Kønsforskelle er ikke dokumenteret, og levetiden i boksen (5-10 år) er et skøn for en lille gekko.

## Udbredelse og levested

*Saurodactylus brosseti* lever i det vestlige Marokko, og typelokaliteten er Souss-dalen i sydvest. I snæver forstand findes arten fra et stykke syd for Agadir og mod nord. Syd for Agadir og videre ned langs Atlanterhavskysten til Vestsahara lever den nært beslægtede *Saurodactylus harrisii*, og egnen omkring Agadir er en kontaktzone mellem de to. Arten findes fra kysten op til omkring 1.100 m over havet.

Arten vurderes på IUCN's globale rødliste som ikke truet.

> **Oprindelig udbredelse:** Marokko.

### LEVESTED

*Saurodactylus brosseti* lever i Marokkos vestlige dele, hvor klimaet er middelhavsagtigt til halvtørt med varme, tørre somre og køligere, fugtigere vintre. Levestederne er skov, klippeterræn, dyrket land og græsningsarealer. Arten lever på jorden og er aktiv om dagen og i skumringen.

Temperaturer og luftfugtighed på levestederne er ikke dokumenteret, så tallene i boksen bygger på klimaet.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

## Pasning

### TERRARIET

Der findes næsten ingen viden om pasningen af *Saurodactylus brosseti*. Klimaet i udbredelsesområdet er middelhavsagtigt med varme, tørre somre og milde, fugtigere vintre, og arten er en meget lille, jordlevende gekko. *Euleptes europaea* er en anden lille gekko i samme familie og lever i et lignende middelhavsklima.

Et par kan holdes i et terrarie på 40 × 30 × 30 cm. Bundarealet betyder mere end højden. Brug en bund af sand blandet med leret jord i et lag på 4-5 cm, og læg flade sten, korkbark og tørt løv som skjul i både den varme og den kølige ende. Stenene skal stå direkte på terrariets bund, ikke oven på sandet, så de ikke kan skride ned over dyret. Alle sprækker og åbninger skal lukkes, for dyret er meget lille.

### TEMPERATUR

Om dagen holdes bunden på 22-28 °C med et lille varmested på 30-32 °C under en svag spotlampe styret af en termostat. Om natten falder temperaturen til 12-18 °C. Temperaturerne på levestederne er ikke dokumenteret; tallene passer til klimaet.

Om vinteren kan dagslængden og temperaturen sænkes nogle grader i et par måneder, så årsrytmen ligner middelhavsklimaets milde vintre. En egentlig vinterhvile er ikke dokumenteret for arten. Mål temperaturen med digitale termometre i både den varme og den kølige ende.

Læs mere: Varme og temperatur Læs mere: Vinterhvile og årstider

### LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden på levestederne er ikke dokumenteret; 40-60 % passer til klimaet. Sprøjt terrariet let hver anden til tredje dag, så der sidder dråber på sten og blade, som dyret kan drikke, og lad det tørre op mellem sprøjtningerne. Giv et fugtigt skjul, fx en lille boks med fugtig kokosfiber, så dyret selv kan vælge. En vandskål er ikke nødvendig.

### LYS OG UVB

*Saurodactylus brosseti* er aktiv om dagen og i skumringen. Et svagt UVB-rør i den ene ende af terrariet med rigelig skygge og skjul anbefales; Ferguson-zone 1 passer til en lille gekko, der mest færdes i skygge og skumring, men zonen er ikke målt for arten. Pudr desuden foderdyrene med kalk og D3-vitamin.

Hav lyset tændt omkring 12-13 timer om dagen om sommeren og 10 timer om vinteren, styret af et tænd-sluk-ur.

Læs mere: Lys og UVB Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

### FODER

I naturen lever arten af små leddyr. Foderdyrene skal være meget små, ikke større end dyrets hoved: springhaler, bananfluer, nyklækkede fårekyllinger og små bænkebidere.

Fodr hver anden dag med så meget, som dyret spiser på omkring fem minutter, og pudr foderdyrene let med kalk ved hver fodring og med vitaminer hver anden til tredje fodring. Sørg for en stabil forsyning af små foderdyr, før dyret anskaffes.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl

### ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten jager som ventejæger: den sidder stille og slår til, når et lille insekt kommer forbi. Adfærden i fangenskab er ikke dokumenteret. Hold dyret enkeltvis eller et par i et rummeligt terrarie med mange skjul. To hanner skal ikke holdes sammen. Dyret er for lille og skrøbeligt til at blive håndteret og flyttes ved at lade det kravle ind i en lille beholder.

## Avl

### KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Alder ved kønsmodenhed og kønsforskelle er ikke dokumenteret for arten. Hos så små gekkoer er kønnet svært at se uden lup; kig efter hemipenisbulerne ved halens rod. Et par kan derfor ikke sammensættes sikkert.

### PARRING

Parring og avl i fangenskab er ikke dokumenteret for arten. Et par i et rummeligt terrarie med mange skjul og en tydelig årstidsrytme, med kortere dage og lidt køligere temperaturer om vinteren, er et rimeligt udgangspunkt.

### ÆGLÆGNING OG KULD

Hunnen lægger ét æg ad gangen. Tallet stammer fra før komplekset blev delt op og kan gælde flere af arterne. Hvor mange æg hun lægger om året, er ikke dokumenteret. Giv hende et let fugtigt sted under en flad sten eller et stykke bark, og tjek jævnligt efter æg. Et æg tages forsigtigt ud, uden at det vendes.

### INKUBATION

Inkubationen er ikke dokumenteret for arten. Boksens 60-90 dage ved 24-28 °C er et skøn ud fra andre små gekkoer. Læg ægget i en lille ventileret boks med let fugtig vermiculite, og vend det ikke.

### OPDRÆT AF UNGER

Opdræt er ikke dokumenteret for arten. Ungerne er meget små og skal have springhaler og nyklækkede bananfluer hver dag, pudret med kalk, i en lille, tæt boks med samme indretning som de voksnes.

## Sundhed og typiske fejl

Der er ikke dokumenteret sygdomme, der er særlige for *Saurodactylus brosseti*. Som hos andre meget små gekkoer er de typiske problemer:

- For lidt kalk og D3-vitamin, som kan give bløde knogler og rystelser.
- Ensidigt foder eller for store foderdyr.
- For tørt terrarie uden fugtigt skjul, som giver problemer med hudskifte, eller for vådt terrarie, som giver hudinfektioner.
- Sten og træstykker, der skrider, fordi de står oven på bundlaget.
- Slagsmål mellem hanner.

Søg dyrlæge med erfaring i krybdyr, hvis dyret taber sig, ikke spiser eller virker sløvt.

### Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.