herpy

GEKKOER

Ocellated gecko

Sphaerodactylus argus

En lille, dagaktiv dværggekko fra Jamaica og øerne San Andrés og Providencia, kun godt 6 cm lang med halen. *Sphaerodactylus argus* er brunlig med gule prikker og streger på hovedet, lever i tør skov og løvlag og kan holdes parvis i et lille, tæt terrarie.

Familie: Sphaerodactylidae Tidligere navn: *Sphaerodactylus argus andresensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**10-20 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**24-28 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**50-60 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6-10 mdr.**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**100 dage** ved 28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige tilladelser ved køb og salg. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Sphaerodactylus argus*, men arten er let at holde og yngle. Den passes som de beslægtede *Sphaerodactylus elegans* og *Sphaerodactylus macrolepis*, dog lidt tørrere.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 26-28 °C. Et lysstofrør kan give den varme, der skal til, så en spotlampe er ikke nødvendig og kan let overophede et lille terrarie.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 50-60 %, lavere end til de fleste andre dværggekkoer, fordi arten lever på tørre steder. Det er nok at sprøjte terrariet hver anden dag, når der står en lille, lav vandskål fremme.
LYS OG UVB	Gekkoen er dagaktiv. Hold lyset tændt 12 timer om dagen forår og sommer og 10 timer om vinteren. Et lysstofrør eller en kompaktlysstofpære i dagslysfarve er nok og giver samtidig den varme, der skal til.
FODER	Gekkoen er insektæder, og alt foder skal være lille, højst så stort som dyrets hoved. Voksne tager små fårekyllinger, små bænkebidere, store bananfluer (*Drosophila hydei*), voksmøl og voksmøllarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hold arten enkeltvis eller som et par. To hanner må ikke sættes sammen, fordi de slås.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Jamaica og Colombia.