herpy

GEKKOER

Barbour's least gecko

Sphaerodactylus torrei

En lille, dagaktiv gekko fra det sydøstlige Cuba med markant forskel på kønnene: hannen har gult hoved og knaldorange hale, hunnen er lys med mørke tværbånd. *Sphaerodactylus torrei* bliver kun omkring 8 cm inklusive hale, lægger ét æg ad gangen og kræver små foderdyr og et tæt lukket terrarie.

Familie: Sphaerodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-28 °C**
Hotspot	**31-32 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Kuld pr. år	**1-4**
Inkubation	**80-90 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på bilag III i CITES (Cuba) og på bilag C i EU's forordning om handel med vilde dyr. Ved handel og indførsel kræves derfor dokumentation for lovlig oprindelse, og dyr bør kun købes som opdræt i fangenskab. IUCN regner arten for truet. Tjek de aktuelle regler hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du køber eller sælger.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et par af *Sphaerodactylus torrei* kan holdes i et terrarie på 60 × 45 × 45 cm (længde × bredde × højde). Et enkelt dyr klarer sig i lidt mindre. Dyrene er territoriale, så hold enten ét dyr eller ét par.

TEMPERATUR

Om dagen skal der være 26-28 °C, og et lille område må i sommerhalvåret nå 31-32 °C. Om natten falder temperaturen til omkring 24 °C. Til en kølig vinterperiode kan natten sænkes til omkring 18 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Hold den relative luftfugtighed på omkring 70-80 % ved at sprøjte terrariet dagligt eller hver anden dag.

LYS OG UVB

Sphaerodactylus torrei er dagaktiv, og et svagt UVB-lys i Ferguson-zone 1 anbefales. Brug et UVB-rør med lav styrke over den ene halvdel af terrariet, så der altid er skygge.

FODER

Sphaerodactylus torrei lever af småt, levende bytte. I naturen er det små fårekyllinger, møl, fluer og billelarver, og i fangenskab passer små fårekyllinger, bananfluer, små voksmøllarver og små larver af sort soldaterflue.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Sphaerodactylus torrei er territorial og aggressiv, så den holdes enkeltvis eller som ét par med meget skjul og plads. Dyrene er små, hurtige og bliver let stressede af håndtering, så de er et dyr at kigge på, ikke at tage op.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Cuba.