herpy

GEKKOER

## Middle Eastern short-fingered gecko

# *Stenodactylus doriae*

En af de største arter i slægten *Stenodactylus*: en slank, nataktiv jordlever med lange ben og frynsede tæer, der graver sig ned i sandet om dagen. Der findes kun lidt viden om pasningen, men arten kan holdes som sine nærmeste slægtninge i et tørt sandterrarie.

Familie: Gekkonidae  Tidligere navn: *Ceramodactylus doriae; Ceramodactylus major; Stenodactylus major*

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **5-8 cm**<br>snude-kloak-længde |
| Vægt | **5-11 g** |
| Levetid | **9-10 år** |
| Aktiv | **Nat** |
| Levevis | **Jordboende og gravende** |
| Biotop | **Ørken** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 40 × 20 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **24-29 °C** |
| Hotspot | **35-38 °C** |
| Temperatur, nat | **18-24 °C** |
| Luftfugtighed | **40-60 %** |
| UVB | **Valgfri** |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **8 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Inkubation | **60-80 dage**<br>ved 27-30 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten er hverken opført under CITES eller i bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen særlige papirer ved køb, salg eller indførsel. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav. Arten ses sjældent i handlen, og dyrene har traditionelt været vildfangede, så spørg sælgeren om herkomst, og vælg helst opdrættede dyr.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Stenodactylus doriae*. Opstillingen følger de nærmeste slægtninge *Stenodactylus petrii* og *Stenodactylus sthenodactylus*, som stammer fra de samme ørkener.

**TEMPERATUR**
Om dagen skal der være 24-29 °C i terrariet og 35-38 °C på det varmeste sted, fx over en varmemåtte eller et varmebånd under bunden eller under en lampe i den ene ende. Den anden ende skal være køligere, så dyrene kan vælge.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**
Luften skal være lav til moderat fugtig, omkring 40-60 %. Forstøv en del af terrariet let om aftenen en eller to gange om ugen, så der kommer fugtige pletter og vanddråber, og lad resten være tørt.

**LYS OG UVB**
Arten er nataktiv og kan leve uden UVB, når den får kalk med D3-vitamin gennem foderet. Et svagt UVB-lys over en del af terrariet er valgfrit, så længe dyrene kan grave sig ned i skygge.

**FODER**
Grundfoderet er levende insekter, mest fårekyllinger, suppleret med voksmøllarver, melorme, mini-melorme og flyveudygtige bananfluer. Insekterne må højst være lige så brede som gekkoens hoved. Fodr om aftenen, flere gange om ugen.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**
*Stenodactylus doriae* er ikke til håndtering. Den er hurtig og skrøbelig, og halen kan tabes. Dyrene kommer frem efter mørkets frembrud og tilbringer dagen i deres gange. Hannerne kan give lyd.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**
Saudi-Arabien, Qatar, Iran, Irak, Israel, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Jordan og Kuwait.