herpy

GEKKOER

Northern spiny-tailed gecko

Strophurus ciliaris

Strophurus ciliaris er en slank, spinkel gekko fra det indre og nordlige Australien med lange pigge over øjnene, pigget hale og en stærkt farvet mund. Den klatrer rundt i buske og spinifex, soler sig gerne og kan sprøjte en lugtende væske fra halen, hvis den bliver truet.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Diplodactylus ciliaris* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-10 år**
Aktiv	**Dag, skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Halvørken**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-29 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-25 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**6-10**
Inkubation	**55-65 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Strophurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Australien tillader ikke eksport af sine vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Højden betyder mere end bundarealet, fordi *Strophurus ciliaris* er en klatrer.
TEMPERATUR	Terrariet til *Strophurus ciliaris* skal have en varm zone øverst og en køligere zone nederst. Giv en varm plet på omkring 32 °C højt oppe og 25-27 °C ved bunden om sommeren.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	*Strophurus ciliaris* skal have lav luftfugtighed. Konkrete tal er ikke dokumenteret, men 30-50 % passer til artens tørre levesteder.
LYS OG UVB	*Strophurus ciliaris* er aktiv i skumringen og om natten, men soler sig også om dagen. UV-lys er sandsynligvis gavnligt, selv om dyr også har levet længe uden. UVB anbefales derfor.
FODER	*Strophurus ciliaris* lever af leddyr og er ikke kræsen.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Strophurus ciliaris* er nysgerrig og dristig ved fodring og kommer ofte frem for at møde insekterne, men den bliver let stresset af håndtering og er ikke et dyr, der skal tages op hver dag.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/strophurus-ciliaris