herpy

GEKKOER

Southern spiny-tailed gecko

Strophurus intermedius

Strophurus intermedius er en kraftigt bygget pighalegekko fra de halvtørre mallee-krat og skove i det sydlige Australien. Ryggen og halen har to rækker orangebrune knopper, og ved fare sprøjter den en klæbrig, ildelugtende væske ud af halen. Den klatrer i buske og træer, men færdes også meget på jorden.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Diplodactylus intermedius* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**6-8 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**4-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**30 × 30 × 45 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-25 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**24-36 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-5**
Inkubation	**45-60 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Strophurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Australien forbyder udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Spørg altid sælgeren om opdrætsbevis.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Pighalegekkoer bruger pladsen godt, så terrariet behøver ikke være stort. Et par eller en lille gruppe kan holdes i 30 × 30 × 45 cm (længde × bredde × højde).

TEMPERATUR
Brug 25-30 °C om dagen og et solested på 30-32 °C højt oppe på en gren. Om natten slukkes varmen, og temperaturen må falde til 18-25 °C. Tallene er lånt fra slægtens øvrige arter.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være moderat, omkring 40-60 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen. Sprøjt let på grene og vægge et par aftener om ugen, så dyret kan drikke dråber, og lad bunden tørre imellem.

LYS OG UVB
Arten soler sig af og til, så UVB er en fordel, især for unger og avlshunner. Brug et T5 HO-rør med 6 % UVB over netlåget, så UV-indekset på de øverste grene ligger omkring 1-3 (Ferguson-zone 2), med skygge i den anden ende.

FODER
I naturen lever *Strophurus intermedius* udelukkende af leddyr: edderkopper, skolopendre, skorpioner, kakerlakker, fårekyllinger, biller og deres larver.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Strophurus intermedius er et dyr at kigge på og bør ikke håndteres mere end højst nødvendigt. Den kan sprøjte sin klæbrige, ildelugtende væske, og den kan miste halen. Tag aldrig fat i halen.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Australien.