herpy

GEKKOER

## South-western spiny-tailed gecko

# *Strophurus spinigerus*

*Strophurus spinigerus* er en lille pighalegekko fra det sydvestlige Australien. Den er olivengrå med to rækker sorte pigge på halen og ofte en bred, takket sort stribe ned langs ryggen. Den klatrer i buske og træer om natten og kan sprøjte en klæbrig, ildelugtende væske ud af halen, når den bliver forskrækket.

Familie: Diplodactylidae  Tidligere navn: *Diplodactylus spinigerus*

**SPECIFIKATIONER**

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **9-11 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **6-10 år** |
| Aktiv | **Skumring og nat** |
| Levevis | **Træboende og jordboende** |
| Biotop | **Halvørken og tempereret skov og eng** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **30 × 30 × 45 cm**<br>L × B × H til 2 voksne dyr |
| Temperatur, dag | **25-30 °C** |
| Hotspot | **30-32 °C** |
| Temperatur, nat | **18-25 °C** |
| Luftfugtighed | **40-60 %** |
| UVB | **Anbefalet**<br>Ferguson-zone 2 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **12-24 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Kuld pr. år | **2-6** |
| Inkubation | **45-60 dage**<br>ved 27-30 °C |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks III** |
| EU-bilag | **Bilag C** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Slægten Strophurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Køb kun dyr med kendt oprindelse.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Strophurus spinigerus*. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen skal der være 25-30 °C, og på en gren højt oppe skal der være et solested på 30-32 °C. Om natten slukkes varmen, og temperaturen må falde til 18-25 °C. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Luftfugtigheden skal være moderat, omkring 40-60 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen. Forstøv let på grene og vægge to aftener om ugen, så dyrene kan drikke dråber, og lad bunden tørre imellem. |
| **LYS OG UVB** | Arten soler sig i naturen blandt de tynde grene, så UVB er en fordel. Brug et T5 HO-rør med 6 % UVB over netlåget, så UV-indekset på de øverste grene ligger omkring 1-3 (Ferguson-zone 2), med skygge i den anden ende. |
| **FODER** | I naturen lever slægten af leddyr: edderkopper, kakerlakker, fårekyllinger, biller, termitter og deres larver. I terrariet passer små fårekyllinger, kakerlakker, møl, fluer og voksmøllarver. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | *Strophurus spinigerus* er et dyr, man kigger på, og den bør ikke håndteres mere end højst nødvendigt. Den kan sprøjte sin klæbrige, ildelugtende væske og kan miste halen, så tag aldrig fat i halen. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Australien. |

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/strophurus-spinigerus