herpy

GEKKOER

Eastern spiny-tailed gecko

Strophurus williamsi

Strophurus williamsi er en lille træboer fra det tørre indre af det østlige Australien. Ryggen og halen er besat med gulorange pigge, og når den bliver truet, sprøjter den en sej, ildelugtende væske ud af halen. Den soler sig gerne om dagen, men jager mest i skumringen og om natten. Der findes kun få pålidelige pasningsoplysninger om netop denne art, så den egner sig bedst til erfarne holdere.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Diplodactylus williamsi* Udgivet 15. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**10-13 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-10 år**
Aktiv	**Dag, skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Halvørken og savanne**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**30-32 °C**
Temperatur, nat	**18-25 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**2-5**
Inkubation	**43-80 dage** ved 27-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Strophurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Australien forbyder udførsel af vilde dyr, så dyr i handlen er opdrættet i fangenskab. Spørg altid sælgeren om opdrætsbevis.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes næsten ingen udførlige pasningsvejledninger til *Strophurus williamsi*, så målene her bygger på erfaringer med pighalegekkoerne generelt.
TEMPERATUR	*Strophurus williamsi* er varmekrævende og lever i et klima med stor døgnvariation. Brug en dagtemperatur på 25-30 °C i terrariet og et solested på omkring 30-32 °C, som gekkoen kan søge mod og forlade igen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Til *Strophurus williamsi* skal luftfugtigheden være moderat, omkring 40-60 %, og terrariet skal tørre helt op i løbet af dagen.
LYS OG UVB	*Strophurus williamsi* soler sig i naturen, så den har gavn af UVB.
FODER	I naturen lever *Strophurus williamsi* af leddyr, især fårekyllinger, græshopper, møl, edderkopper og termitter. Giv i fangenskab en varieret blanding af små foderinsekter som fårekyllinger, små kakerlakker og små græshopper.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Strophurus williamsi* er mest et dyr at kigge på. Den er hurtig og nervøs og bør ikke håndteres mere end højst nødvendigt.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.