herpy

GEKKOER

Turnip-tailed gecko

Thecadactylus rapicauda

En af Amerikas største gekkoer: en nataktiv lurejæger uden bevægelige øjenlåg, med lodrette pupiller, blå tunge og en hale, der vokser ud tyk som en roe efter et tab. Arten er udbredt fra Mexico til Brasilien, men er sjælden i terrarier, og der findes kun få pålidelige oplysninger om pasning.

Familie: Phyllodactylidae Tidligere navn: *Gekko rapicauda; Gekko laevis; Platydactylus theconyx* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-13 cm** snude-kloak-længde
Vægt	**16-40 g**
Levetid	**8-12 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-28 °C**
Hotspot	**30-31 °C**
Temperatur, nat	**21-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller parvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**150-200 dage** ved 24-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er ikke opført på CITES-listerne og ikke på bilagene til EU's forordning om handel med vilde dyr, så der kræves ingen CITES-papirer ved køb og salg. Dyrevelfærdslovens almindelige krav om passende husning og pasning gælder. Tjek altid de aktuelle regler hos Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, før du anskaffer dyret.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun få erfaringer med arten i fangenskab, så målene bygger på de generelle krav til nataktive, klatrende gekkoer fra fugtige egne.
TEMPERATUR	Arten er aktiv inden for et forholdsvis snævert temperaturområde. Om dagen passer 25-28 °C, og et lidt varmere sted på 30-31 °C øverst i terrariet giver dyret mulighed for at vælge.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Arten skal have høj luftfugtighed. I naturen er omkring 60 % angivet som ideelt, og 60-80 % er et fornuftigt mål i terrariet, hvor fugten stiger efter en sprøjtning om aftenen og falder i løbet af dagen.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og gemmer sig i mørke sprækker om dagen, så UVB er ikke nødvendigt, når foderet får kalk og D3-vitamin.
FODER	I naturen er arten en lurejæger med et meget bredt kostvalg. Maveindhold fra vilde dyr viser græshopper, kakerlakker, biller, sommerfugle, edderkopper og skorpioner, og den tager i sjældne tilfælde også små padder og firben.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Dyret er langsomt og besindigt, når det ikke er truet, men kan være kvikt og aggressivt, når det bliver forstyrret. Det kan bide hårdt, og halen kaster det ved selv ringe pres.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam, Fransk Guyana, Brasilien, Trinidad og Tobago, Aruba, Curaçao, De tidligere Nederlandske Antiller, Antigua og Barbuda, Saint Lucia og Grenada.