herpy

GEKKOER

Natterer's gecko

Tropiocolotes nattereri

En af verdens mindste gekkoer, kun 4-6 cm med hale, fra kysterne ved Aqababugten på Sinai og i det sydligste Israel og Jordan. Den er nataktiv og lever på stenet grund. Der findes kun lidt viden om pasningen, men den passes som slægtens bedre kendte arter i et terrarie på mindst 20 × 20 × 20 cm.

Familie: Gekkonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**4-6 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-10 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Jordboende**
Biotop	**Ørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**20 × 20 × 20 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**26-30 °C**
Hotspot	**35-45 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Valgfri**
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis, parvis, 1 han med flere hunner eller i gruppe**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1 æg**
Inkubation	**60-90 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Tropiocolotes nattereri*.
TEMPERATUR	Hold 26-30 °C om dagen og en lille varmeplet på 35-45 °C i den ene ende, målt på en flad sten under lampen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luften skal være tør, omkring 30-50 % og ikke over 60 %. Spray en del af terrariet to-tre gange om ugen om aftenen eller tidligt om morgenen: dyrene slikker dråberne af sten og skjul, som de slikker dug i naturen.
LYS OG UVB	*Tropiocolotes nattereri* er nataktiv, men slægtens arter bruger gerne varmepletten, og en fast døgnrytme er vigtig.
FODER	*Tropiocolotes nattereri* lever af meget små leddyr.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Adfærden hos *Tropiocolotes nattereri* i fangenskab er ikke beskrevet. Slægtens holdte arter er små, men meget aktive, jager ivrigt om aftenen og er fredelige over for hinanden.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Egypten, Israel, Jordan og Saudi-Arabien.