herpy

GEKKOER

Pilbara barking gecko

Underwoodisaurus seorsus

Underwoodisaurus seorsus er en slank, nataktiv jordgekko fra klippekløfterne i Hamersley Range i Pilbara i Vestaustralien, rødbrun med spredte lyse knopper og en lang, spids hale. Arten blev først beskrevet i 2011, er sjælden og kendes kun fra et lille område.

Familie: Carphodactylidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** snude-kloak-længde
Levetid	**10-15 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Halvørken og klippeterræn**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 40 × 30 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**28-32 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**30-50 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**58-65 dage** ved 27-29 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Slægten Underwoodisaurus står siden 22. juni 2022 på CITES liste III (opført af Australien) og i bilag C i EU's forordning 338/97. Køb og salg inden for EU kræver ingen CITES-papirer, men ved indførsel fra lande uden for EU skal dyret have CITES-eksporttilladelse eller oprindelsescertifikat fra afsenderlandet, og indførslen skal anmeldes ved grænsen. Køb kun opdrættede dyr med kendt oprindelse.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Underwoodisaurus seorsus*. Tallene her er lånt fra den bedre kendte slægtning *Underwoodisaurus milii*, der har samme størrelse og også ofte lever mellem sten.
TEMPERATUR	Hold baggrunden på 22-26 °C om dagen og et varmt sted i den ene ende på 28-32 °C. Om natten kan temperaturen falde til 15-20 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Hold terrariet tørt ved en luftfugtighed på 30-50 %. Sprøjt en eller to gange om ugen, og lad overfladerne tørre igen. Der skal altid være ét fugtigt skjul med let fugtigt sand eller mos, så hudskiftet går let.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv og har ikke brug for stærkt lys. UVB er valgfrit; et svagt UVB-lys, svarende til Ferguson-zone 1, over en del af terrariet kan bruges, når der er rigeligt med skjul, så dyret altid kan gemme sig for lyset.
FODER	Arten lever udelukkende af insekter og andre små leddyr. Giv fårekyllinger, små kakerlakker og soldaterfluelarver som grundfoder og en gang imellem melorme eller voksmøllarver.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Adfærden er ikke beskrevet for *Underwoodisaurus seorsus*. Behandl dyret som et dyr at se på snarere end at have på hånden. Hold håndteringen kort og tæt over bunden, og tag det ikke op om dagen, hvor det sover.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Australien.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/gekkoer/underwoodisaurus-seorsus