herpy

GEKKOER

Common flat-tail gecko

Uroplatus fimbriatus

Slægtens klassiker og en af de største bladhalegekkoer: et frynset, barkfarvet nattedyr fra regnskovene i det østlige Madagaskar, der om dagen smelter sammen med træstammen. Den er imponerende at se på, men har brug for kølige temperaturer, høj fugt og en tålmodig, erfaren holder.

Familie: Gekkonidae Tidligere navn: *Stellio fimbriatus* Udgivet 14. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-33 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**7-10 år**
Aktiv	**Skumring og nat**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**17-21 °C**
Luftfugtighed	**65-95 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**100-230 dage** ved 18-26 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Hele slægten Uroplatus står på CITES bilag II og er i EU opført på bilag B i forordning 338/97. Handel inden for EU kræver dokumentation for, at dyret er lovligt erhvervet (fx faktura eller oprindelsesbevis), og indførsel fra lande uden for EU kræver CITES-tilladelser. Spørg sælgeren om papirer, og gem dem. Dyrevelfærdslovens almindelige krav gælder også.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Arten bruger højden, så terrariet skal være højt.
TEMPERATUR	Arten tåler varme dårligt og skal holdes køligere, end mange tror. Om dagen er 22-25 °C passende, og om natten skal temperaturen falde til 17-21 °C. Nattefaldet er en vigtig del af døgnrytmen.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Høj luftfugtighed er det vigtigste i pasningen, for arten tørrer let ud. Hold luftfugtigheden på 65-70 % om dagen og 80-95 % om natten, og lad bunden tørre lidt op i løbet af dagen.
LYS OG UVB	Arten er aktiv i skumringen og om natten og hører til Ferguson-zone 1 sammen med andre skyggedyr. Der er kun få dokumenterede erfaringer med UVB til netop denne art, men et svagt UVB-lys anbefales i dag til hele slægten.
FODER	Arten æder insekter og tager næsten kun levende bytte. Giv en blanding af fårekyllinger, græshopper, dubia-kakerlakker og store melorme, og voksmøllarver som godbid. Byttet må ikke være bredere end afstanden mellem gekkoens øjne.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Gekkoen satser på camouflage frem for flugt og er sky og stressfølsom. Vildfangede dyr springer og kan bide, når de bliver rørt. Opdrættede dyr er roligere, men heller ikke de egner sig til hyppig håndtering.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.