herpy

GEKKOER

Raukawa gecko

Woodworthia maculata

En lille, nataktiv og stenfarvet gekko fra New Zealand, der lever på klipper, strande og i krat og kan blive over 30 år. Den føder levende unger og er meget sjælden i terrarier uden for oprindelseslandet, så der findes kun lidt pasningsviden.

Familie: Diplodactylidae Tidligere navn: *Hoplodactylus maculatus; Naultinus maculatus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-18 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**30-40 år**
Aktiv	**Nat**
Levevis	**Klippeboende og jordboende**
Biotop	**Klippeterræn og tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**50 × 50 × 100 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**18-24 °C**
Temperatur, nat	**10-16 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
UVB	**Valgfri** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter, frugt, nektar og færdigfoder**
Holdes	**Parvis, 1 han med flere hunner eller i gruppe**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**18-24 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 unger**
Kuld pr. år	**1**
Drægtighed	**90-150 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks III**
EU-bilag	**Bilag C**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten er opført på CITES bilag III (New Zealand) og i EU's bilag C, som gælder hele slægten *Woodworthia*. Levende dyr udføres ikke fra New Zealand til handel, så dyr uden for landet er meget sjældne. Ellers gælder dyrevelfærdslovens almindelige krav.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Woodworthia maculata*, fordi arten næsten ikke holdes uden for New Zealand.
TEMPERATUR	Der findes ingen dokumenterede temperaturer for dyr i fangenskab. Anbefalingen bygger på klimaet i udbredelsesområdet: om dagen 18-24 °C og om natten 10-16 °C, med et fald hen over natten og køligere forhold om vinteren.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 50-70 %, og terrariet skal kunne tørre delvist op i løbet af dagen. Spray en del af terrariet let om aftenen, så der er dug på blade og sten.
LYS OG UVB	Arten er nataktiv, men den sidder ofte i åbningen af sit skjul og tager lidt lys og varme.
FODER	*Woodworthia maculata* spiser især nataktive insekter og andre leddyr: fårekyllinger, møl, små kakerlakker, edderkopper, biller og fluer. Til unger bruges bananfluer, små møl, små fluer og små fårekyllinger.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Woodworthia maculata* er sky og trækker sig hurtigt tilbage i skjul. Den er ikke et dyr til håndtering, og dyr, der gribes, kan tabe halen. Om aftenen kan nogle dyr kvidre og pippe længe fra åbningen af skjulet.
OPRINDELIG UDBREDELSE	New Zealand.