herpy

KAMÆLEONER

Plated Leaf Chameleon

Brookesia stumpffi

Brookesia stumpffi er en lille, bladlignende kamæleon fra skovbunden i det nordlige og nordvestlige Madagaskar. Den bliver op til omkring 9 cm, har en række torne langs hver side af ryggen og skifter kun lidt farve. Den lægger 2-5 æg og kan holdes i par. Den kræver høj luftfugtighed, et tykt løvlag og meget små foderdyr til ungerne.

Familie: Chamaeleonidae Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-9 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-4 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**5 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-5 æg**
Inkubation	**45-70 dage** ved 18-23 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Brookesia* undtagen *B. perarmata* (liste I/bilag A). Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et par skal have et terrarie på mindst 40 × 30 × 40 cm (længde × bredde × højde). Målet er et skøn ud fra dyrets størrelse, og større er en fordel, især hvis der er flere hunner.

TEMPERATUR
Dagtemperaturen er 22-25 °C, og om natten er 18-20 °C passende. Det svarer til klimaet i løvlaget i udbredelsesområdet. Arten behøver ingen varm solplads, og en svag varmekilde i den ene ende er nok.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være 70-100 %, så den holder sig høj i løvlaget hele døgnet. Sprøjt terrariet 1-2 gange om dagen, så løv og planter er fugtige, men så overfladerne er tørre igen, før der sprøjtes næste gang.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv. Et svagt UVB-lys svarende til Ferguson-zone 1 er nok, og dyret skal altid kunne trække sig ind i skygge. Zonen er et skøn ud fra levevisen i skovbunden; hvor meget UVB arten har brug for, er ikke dokumenteret.

FODER
Brookesia stumpffi æder små insekter som fårekyllinger, bananfluer, kakerlakker, voksmøl og små græshopper. Foderdyrene skal være små, og ungerne fodres med springhaler, bananfluer og nyklækkede fårekyllinger.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
B. stumpffi er rolig og dagaktiv og går langsomt rundt i løvet. Truet lader den sig falde og ligger stille som et dødt blad. Det er en naturlig forsvarsadfærd og ikke tegn på sygdom.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Madagaskar.