herpy

KAMÆLEONER

Brown Leaf Chameleon

Brookesia superciliaris

Brookesia superciliaris er en af de største bladkamæleoner og bliver 9-10 cm i alt. Den lever i løvlaget i Madagaskars østlige regnskove, er brun som et dødt blad og har store knogleknolde over øjnene. Arten holdes i et lille, fugtigt terrarie med et dybt løvlag og små foderdyr. Den har ry for at være svær, men opdrættes i dag regelmæssigt i små antal.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo superciliaris* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**9-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**2-4 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**70-95 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**4-5 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-5 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**45-120 dage** ved 18-27 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Brookesia*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt samlet viden om pasningen af *Brookesia superciliaris*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 20-25 °C og nattemperaturen 16-20 °C, som i regnskoven i højlandet. Faldet om natten kommer af sig selv, når lamperne slukkes.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 70-95 %, højest lige efter sprøjtning og om natten. Sprøjt terrariet grundigt mindst to gange om dagen med lunkent vand. Dyrene drikker dråber fra bladene og bruger ikke en skål.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og lever i skygge.
FODER	Arten æder små insekter: bananfluer, springhaler, små fårekyllinger, bønnebiller og små kakerlakker. Byttet må højst være omkring 20 % af dyrets kropslængde.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis. Den er sky, men livlig og bliver let stresset af forstyrrelse og berøring, så den skal ikke tages i hånden. Ved fare kan den vibrere. Tæt vegetation og et dybt løvlag med skjul mindsker stress.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.