herpy

KAMÆLEONER

Boettger's Chameleon

Calumma boettgeri

Calumma boettgeri er en af de mindste kamæleoner, kun 8-10 cm lang, med en blød, rundoval tap på snuden og afdæmpede farver i gult, grønbrunt og beige. Den lever i regnskoven i det nordvestlige Madagaskar, bl.a. på øerne Nosy Be og Nosy Komba. Arten kræver varm og fugtig luft med køligere nætter og er for den erfarne holder. Afgrænsningen har været uklar.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo boettgeri; Chamaeleon boettgeri; Chamaeleon macrorhinus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**8-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-5 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 40 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-27 °C**
Hotspot	**27-29 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9 mdr.**
Kuldstørrelse	**4-5 æg**
Inkubation	**90 dage** ved 22-24 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Calumma*. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø efter bekendtgørelse nr. 1588 af 9.12.2024. Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Calumma boettgeri*. Klimaet nedenfor bygger på målinger fra artens levesteder.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-27 °C, med en solplads på 27-29 °C. Temperaturen må ikke komme over 29 °C på de varmeste grene. Brug en blid varmelampe højt oppe og kontrollér temperaturen på grenene med et IR-termometer.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være høj: 70-80 % i en del af dagen og højere om natten, op mod 100 % efter forstøvning.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have klart dagslys 12 timer i døgnet. UVB anbefales. Sigt mod Ferguson-zone 2, altså et UV-indeks på omkring 2-3 på de højeste grene, med et T5 HO-UVB-rør og rigeligt med skygge.
FODER	*C. boettgeri* æder små insekter: bananfluer, springhaler, små fårekyllinger og små græshopper. Foderdyrene skal være små, fordi dyret selv er så lille. Unger fodres hver dag, voksne dyr hver anden dag.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis, fordi artsfæller er aggressive over for hinanden. Håndtering skal begrænses til det nødvendige, og et nyt dyr får to uger i fred. Dyret er lille og let at overse, så tjek terrariet grundigt, når der åbnes.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Madagaskar.