herpy

KAMÆLEONER

African Chameleon

Chamaeleo africanus

Chamaeleo africanus er en træboende kamæleon fra den tørre savanne i Sahel og langs Nilen, fra Mauritanien til Sudan og Øvre Egypten. Den er ofte grøn med mange sorte pletter, har ingen hudlapper bag på hovedet og bliver 23-46 cm lang. Arten holdes sjældent, og pasningen bygger på klimaet og på slægtens bedre kendte arter. Den skal bo alene i et højt netterrarie med UVB.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo aegyptius; Chamaeleo calcaratus; Chamaeleo candidus; Chamaeleo mexicanus; Chamaeleo basiliscus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**23-46 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og vådområde**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**40-60 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**20-70 æg**
Inkubation	**90 dage** ved 28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Chamaeleo* undtagen *C. chamaeleon* (bilag A). Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter. Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Der findes kun lidt viden om pasningen af *Chamaeleo africanus*, og arten holdes sjældent. Pasningen bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på de nært beslægtede *Chamaeleo dilepis* og *Chamaeleo calyptratus*, hvis tal er lånt.

TEMPERATUR
Chamaeleo africanus skal have 25-30 °C om dagen og en solplads på 32-35 °C. Om natten skal temperaturen falde til 18-22 °C. Tallene er lånt fra *Chamaeleo dilepis* og passer til et varmt savanneklima.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden hos *Chamaeleo africanus* skal ligge omkring 40-60 %. Tallet er et skøn for tør savanne og ligger lidt under tallet for *Chamaeleo dilepis*.

LYS OG UVB
Chamaeleo africanus er dagaktiv og skal have fuldspektret lys og UVB 12-14 timer om dagen. UVB-kilden skal sidde højst omkring 30 cm fra dyret. Ferguson-zone 3 er et skøn ud fra levevisen i åben savanne.

FODER
Chamaeleo africanus er insektæder og skal have levende insekter som fårekyllinger, kakerlakker og silkeorme. Insekterne skal fodres godt med kalkrigt foder og støves med et mineral- og vitamintilskud, før de gives.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Chamaeleo africanus skal helst ikke håndteres. Dyret skal bo alene, og terrariet skal have mange gemmesteder i løvet. Giv et nyt dyr ro, og placér terrariet, så der ikke hele tiden går mennesker forbi.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Mauretanien, Mali, Niger, Nigeria, Benin, Cameroun, Den Centralafrikanske Republik, Sudan, Sydsudan og Egypten.