herpy

KAMÆLEONER

Flap-necked Chameleon

Chamaeleo dilepis

Chamaeleo dilepis er en mellemstor, træboende kamæleon fra savanner, buskads og lysåben skov i store dele af Afrika syd for Sahara. Den kendes på de to hudlapper bag på hovedet og på en hvid stribe langs flanken. Arten er hårdfør for en kamæleon, men næsten alle dyr i handlen er vildfangne. Den skal have et højt netterrarie med UVB, drikker kun dråber og skal bo alene.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo angusticoronatus; Chamaeleo bilobus; Chamaeleo capellii; Chamaeleo isabellinus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-35 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og tørskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**50-70 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**20-75 æg**
Kuld pr. år	**1-3**
Inkubation	**300-365 dage** ved 27-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Chamaeleo* undtagen *C. chamaeleon* (bilag A). Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter. Kamæleoner er ikke omfattet af den danske forbudsliste for private (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et netterrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde). Til en stor hun er 60 × 60 × 90 cm bedre, og større er altid en fordel. Unger kan gå i 40 × 40 × 75 cm.

TEMPERATUR
Om dagen skal temperaturen i terrariet være 25-30 °C, og på en solgren skal der være 32-35 °C. Start med en 60 W-pære og juster efter målingen: en for stærk lampe kan give alvorlige forbrændinger, selv gennem nettet.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være omkring 50-60 %, og efter forstøvning må den gerne komme op mod 70 %, så længe terrariet tørrer igen. Planter hjælper til at holde fugten.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og solelskende og skal have kraftigt lys i 12 timer og mørke i 12 timer. Fuldspektrumlys og UVB er nødvendige, for dyret danner D3 i huden og skal bruge den til at optage kalk.

FODER
Arten æder insekter: fårekyllinger, græshopper, kakerlakker (fx *Blaptica dubia*), silkeorme, hornorme, sorte soldaterfluer og deres larver, og i mindre mængde melorme og voksmøllarver, der er fede.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Chamaeleo dilepis er mild og rolig i forhold til mange andre kamæleoner, men det er et dyr, man kigger på, ikke et, man tager op. Håndtering stresser og må kun ske, når det er nødvendigt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Etiopien, Somalia, Sydsudan, Kenya, Tanzania, Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Namibia, Sydafrika, Eswatini, Lesotho, Angola, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Gabon, Ækvatorialguinea, Cameroun, Nigeria, Togo, Burundi og Rwanda.