herpy

KAMÆLEONER

Carpet Chameleon

Furcifer lateralis

Furcifer lateralis er en lille, farverig kamæleon fra Madagaskars skove, krat og haver. Hunnen er særlig stærkt tegnet, især når hun er drægtig. Arten bliver kun 17-25 cm, modner på få måneder og lever kun 2-3 år, og dens beskedne størrelse gør den til en overkommelig kamæleon for den øvede holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo lateralis; Chamaeleo lambertoni* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**17-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**2-3 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Savanne og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**24-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**18-22 °C**
Luftfugtighed	**60-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**3-6 mdr.**
Kuldstørrelse	**6-23 æg**
Kuld pr. år	**3-6**
Inkubation	**150-400 dage** ved 20-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Furcifer*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 45 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Arten er lille og klarer sig i et mindre terrarie end de store kamæleoner, men højden er vigtig, fordi den bruger buskene fra bund til top.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være 24-29 °C. Brug en solplads på 32-35 °C, målt som overfladetemperatur med et IR-termometer, og lad den øverste del af terrariet ligge på 27-29 °C og skyggede steder og bunden på 21-24 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Luftfugtigheden skal være 60-100 %. Terrariet må gerne tørre ud i løbet af dagen, så længe luften er relativt fugtig, og dyret kan drikke dagligt.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv og solelskende, så den kræver kraftigt lys og UVB. Brug et T5 HO-rør med 6500 K til lys og et UVB-rør, der giver Ferguson-zone 3 på solpladsen.

FODER

F. lateralis er ren insektæder. Byttet skal være omtrent så langt som afstanden mellem øjnene; melorme må gerne være længere. Varier føden: fårekyllinger, melorme, superorme, kakerlakker, bananfluer og bønnebiller.

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis. Hannerne er aggressive og territoriale, og hunnerne stresser let. Dyrene kan bide hinanden, så parring skal overvåges, og dyrene skilles ad, når parringen er slut.

OPRINDELIG UDBREDELSE

Madagaskar.