herpy

KAMÆLEONER

Böhme's Two-horned Chameleon

Kinyongia boehmei

Kinyongia boehmei er en lille, grøn bjergkamæleon, som kun findes i Taita-bjergene i det sydøstlige Kenya. Hannen har to flade, næsten parallelle snudehorn, mens hunnen er uden horn. Arten lægger æg og skal have et køligt, fugtigt klima og et højt, tæt beplantet terrarie. Pasningen er kun lidt dokumenteret, og arten passer bedst til den erfarne holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Bradypodion tavetanum boehmei; Kinyongia tavetana boehmei*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-19 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**6-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**45 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-26 °C**
Hotspot	**28 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**12 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-11 æg**
Inkubation	**180-360 dage** ved 18-22 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97) som en del af slægten *Kinyongia*. Indførsel til EU kræver CITES- og EU-dokumenter, og i Danmark er det Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), der udsteder dem. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Arten står ikke på listen over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015).

Pasning i korte træk

TERRARIET	Pasningen af *Kinyongia boehmei* er kun lidt dokumenteret, og flere af tallene her er skønnet ud fra klimaet i Taita-bjergene.
TEMPERATUR	Om dagen skal der være 22-26 °C med en solplads på omkring 28 °C, og temperaturen må ikke komme over 28 °C. Om natten skal den falde til 15-20 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-80 %. Dyret drikker dråber og kan ikke klare sig med en vandskål: brug et dryp- eller regnanlæg, eller forstøv bladene flere gange om dagen.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have 12-14 timers lys i døgnet med fuldspektrumlys og UVB. Ferguson-zone 2 er et skøn for en bjergkamæleon.
FODER	*Kinyongia boehmei* æder udelukkende insekter. Gode foderdyr er små fårekyllinger, græshopper, stuefluer og frugtfluer, med melorme og voksmøllarver en gang imellem.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	*Kinyongia boehmei* er territorial og stresses af håndtering og af synet af artsfæller. Hannerne viser sig frem med hornene og med farveskift. Tag ikke dyret op uden grund.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Kenya.