herpy

KAMÆLEONER

Usambara Soft-horned Chameleon

Kinyongia tenuis

Kinyongia tenuis er en lille, slank kamæleon fra Usambarabjergene i Tanzania og Shimba Hills i Kenya. Den er brun og grå med lang hale og lange ben og lever højt oppe i fugtig, kølig regnskov. Arten lægger æg. Den er sjælden i fangenskab, og pasningen er kun sparsomt beskrevet.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Bradypodion tenue; Kinyongia tenue; Chamaeleo tenuis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-7 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**14-18 °C**
Luftfugtighed	**70-100 %**
Vand	**Ingen vandskål**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**12-20 æg**
Inkubation	**240-330 dage** ved 17-23 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Truet (EN)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Kinyongia*. Handel over grænser kræver CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Arten er sjælden i fangenskab, og pasningen er kun sparsomt beskrevet. Vejledningen her bygger på klimaet i udbredelsesområdet og på de bedre kendte arter fra samme område, *Kinyongia fischeri* og *Trioceros deremensis*.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 20-25 °C med en moderat solplads på 26-28 °C, og om natten skal temperaturen falde til 14-18 °C. Varme over 30 °C skal undgås. Hold luften i bevægelse, så den ikke bliver stillestående.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være høj, 70-100 %, og højest om natten og morgenen. Dyret drikker dråber og skal ikke have vandskål.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og skal have et lyst, men ikke for varmt terrarie. UVB anbefales, og Ferguson-zone 2 er et skøn for en skovkamæleon. Placér røret, så dyret kan vælge mellem lys og skygge, og hav lyset tændt 10-12 timer i døgnet.

FODER
Kinyongia tenuis æder insekter. Fårekyllinger, kakerlakker, silkeorme og små græshopper i passende størrelse er egnede, som hos de beslægtede arter. Foderdyrene skal være opdrættede og have fået næringsrigt foder.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Kamæleoner stresses let af håndtering, og det gælder formentlig også *Kinyongia tenuis*. Tag ikke dyret op uden grund. Arten søger højt op og skal have sine faste sovegrene i den øverste del af terrariet.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kenya og Tanzania.