herpy

KAMÆLEONER

Spectral Pygmy Chameleon

Rhampholeon spectrum

Rhampholeon spectrum er en lille, bladlignende kamæleon på 7-10 cm fra skovbunden i Vest- og Centralafrika. Den er grønbrun til grå som et dødt blad, med to skrå mørke striber på siderne og en lille, blød hudflig på snuden. Den holdes i et lille, fugtigt og tæt beplantet terrarie med et tykt løvlag. Pasningen er kun lidt kendt, så tallene bygger på nære slægtninge.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Brookesia spectrum; Chamaeleo spectrum; Rhampholeon affinis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**7-10 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**2-4 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**40 × 30 × 40 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**16-20 °C**
Luftfugtighed	**70-95 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 1
Kost	**Insekter og små leddyr (springhaler, bananfluer)**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**3-9 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-5 æg**
Inkubation	**150-210 dage** ved 18-23 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Rhampholeon*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Rhampholeon spectrum*.
TEMPERATUR	Dagtemperaturen skal være 20-25 °C og nattemperaturen 16-20 °C. Faldet om natten kommer af sig selv, når lamperne slukkes.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 70-95 % om dagen og 80-95 % om natten. Sprøjt terrariet grundigt mindst to gange om dagen, om morgenen og igen om aftenen, med lunkent vand.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og lever i skygge, så lyset skal ligne skovens dæmpede lys.
FODER	Arten æder små insekter og andre leddyr: bananfluer, små fårekyllinger, bønnebiller, kornsnudebiller, små kakerlakker og springhaler til de yngste. Byttet må højst være omkring 20 % af dyrets kropslængde.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis. Aggressionen mellem artsfæller er lav, men to dyr sammen stresser let det underlegne dyr, så de samles kun til parring. Dyrene er stille og vil ikke røres: berøring får dem til at vibrere og stresser dem.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Cameroun, Congo-Brazzaville, Ækvatorialguinea, Den Centralafrikanske Republik, Gabon og Nigeria.

Hele vejledningen med kort og opdateringer: herpy.org/da/kamaeleoner/rhampholeon-spectrum