herpy

KAMÆLEONER

Usambara Three-Horned Chameleon

Trioceros deremensis

Trioceros deremensis er en stor, kraftigt bygget kamæleon fra bjergskovene i det østlige Tanzania. Hannen bærer tre lange, ringede horn, mens hunnen helt mangler dem. Arten er rolig over for sin holder, men kræver kølige temperaturer og meget høj luftfugtighed, og avlen er krævende, så den er kun for meget erfarne holdere.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo deremensis* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**30-40 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**120-150 g**
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Ekspert**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Temperatur, nat	**18-20 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**9-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**8-60 æg**
Inkubation	**110-130 dage** ved 22 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et voksent dyr skal have et netterrarie på mindst 60 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde). Målet er et skøn: det er sat lidt større end for *Trioceros quadricornis*, fordi *T. deremensis* er større og tungere.
TEMPERATUR	Arten er en bjergart og foretrækker moderate til kølige temperaturer. Dagtemperaturen skal være 20-24 °C og nattemperaturen 18-20 °C.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være mindst 80 % og gerne højere. Arten klarer sig bedst med en ultralydsfugter rettet direkte mod terrariet og en jævn strøm af dryppende vand, helst direkte over dyret.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have rigeligt lys. Brug UVB-lysstofrør og en svag varmelampe. UVB-zonen er ikke målt for arten. Zone 2 er lånt fra *Trioceros jacksonii*, der også er en bjergkamæleon fra Østafrika og regnes til zone 2-3.
FODER	*Trioceros deremensis* er insektæder og har som regel stor appetit. Giv varieret føde som fårekyllinger, fluer, græshopper og andre foderinsekter af passende størrelse.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten holdes enkeltvis og er rolig over for sin holder, men aggressiv over for artsfæller. Den er stillesiddende, vælger gerne ét sted, hvor den sidder længe, og flytter sig mest for at sole sig eller æde.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Tanzania.