herpy

KAMÆLEONER

## Poroto Three-horned Chameleon

# *Trioceros fuelleborni*

*Trioceros fuelleborni* er en lille, kompakt, levendefødende kamæleon fra bjergskovene i det sydvestlige Tanzania. Begge køn har tre korte, ringede horn, og hannens er størst; grundfarven er grøn med brune aftegninger og afbrudte lyse striber langs flanken. Arten kræver køligt klima med et tydeligt nattefald og tåge, og den er meget sjælden i terrariehold.

Familie: Chamaeleonidae  Tidligere navn: *Chamaeleo fuelleborni*

## SPECIFIKATIONER

### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **15-25 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **5-6 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Bjergskov** |
| Sværhedsgrad | **Ekspert** |

### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 45 × 90 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **20-22 °C** |
| Hotspot | **24-26 °C** |
| Temperatur, nat | **10-15 °C** |
| Luftfugtighed | **50-100 %** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 2 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Levendefødende** |
| Kønsmoden | **6-12 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **4-20 unger** |
| Kuld pr. år | **1** |
| Drægtighed | **210-300 dage** |

### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

## Pasning i korte træk

| | |
|---|---|
| **TERRARIET** | Der findes kun lidt viden om pasningen af *Trioceros fuelleborni*. Klimaet i udbredelsesområdet er køligt og fugtigt: omkring 20-22 °C om dagen og 10-15 °C om natten. |
| **TEMPERATUR** | Om dagen skal der være 20-22 °C, med en solplads på 24-26 °C, som dyret kan søge om morgenen. Temperaturen må ikke komme over 26 °C i længere tid. |
| **LUFTFUGTIGHED OG VAND** | Natten er artens fugtige tid. Luftfugtigheden skal ligge på 80-100 % om natten og falde til 50-70 % om dagen. En ultralydsforstøver i anden halvdel af natten og forstøvning lige før lyset tændes giver tåge og dug. |
| **LYS OG UVB** | Arten er dagaktiv og kræver kraftigt lys. Fire T5 HO-rør med 6500 K over terrariets bredde lyser et 90 cm højt terrarie godt op. Giv 12 timers lys og 12 timers mørke hele året; terrariet skal være helt mørkt om natten. |
| **FODER** | *T. fuelleborni* er insektæder og æder alt, hvad der kan være i munden: fårekyllinger, silkeorme, græshopper og fluer. Insekterne skal selv have et rigt foder af grønt, frugt og pollen. Unger fodres dagligt. |
| **ADFÆRD OG HÅNDTERING** | Arten holdes enkeltvis. Den er moderat aggressiv over for artsfæller og sky over for holderen. Den er et udstillingsdyr, ikke et kæledyr, og håndtering skal være kort og sjælden. |
| **OPRINDELIG UDBREDELSE** | Tanzania. |