herpy

KAMÆLEONER

## Von Hoehnel's Chameleon

# *Trioceros hoehnelii*

*Trioceros hoehnelii* er en lille, levendefødende kamæleon fra de kølige højlande i Kenya og Uganda, hvor nætterne kan nærme sig frysepunktet. Hannen har en høj hjelm og ét horn på snuden. Arten er robust over for kulde, men tåler varme dårligt, så den kræver et køligt terrarie med et tydeligt fald i temperaturen om natten og høj nattefugt.

Familie: Chamaeleonidae  Tidligere navn: *Chamaeleo hoehnelii; Chamaeleo bergeri; Chamaeleo leikipiensis*  Udgivet 16. november 2026

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **18-25 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Vægt | **15-70 g** |
| Levetid | **5-6 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende** |
| Biotop | **Bjergskov** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 45 × 90 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **20-22 °C** |
| Hotspot | **24-25 °C** |
| Temperatur, nat | **8-14 °C** |
| Luftfugtighed | **50-100 %** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 3 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Levendefødende** |
| Kønsmoden | **12 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **4-22 unger** |
| Kuld pr. år | **1-2** |
| Drægtighed | **120-180 dage** |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Appendiks II** |
| EU-bilag | **Bilag B** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 90 cm (længde × bredde × højde). Målet er lånt fra lignende små bjergkamæleoner af slægten *Trioceros* og er et minimum. Større er bedre, og højden bruges mere end bunden.

**TEMPERATUR**

Arten kommer fra køligt højland og tåler varme dårligt. Dagtemperaturen i terrariet skal være 20-22 °C, og solpladsen må ikke være varmere end 24-25 °C. Unge dyr kan dø, hvis temperaturen kommer højere op.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**

Natten er artens fugtige tid. Luftfugtigheden skal stige mod 100 % om natten, med tåge fra en ultralydsfugter i omkring tre timer sidst på natten og tidligt om morgenen.

**LYS OG UVB**

Arten er dagaktiv og bruger meget lys. Giv 12 timers lys om dagen hele året. Et T5 HO-rør med 6500 K eller en kraftig LED-lampe over terrariets bredde giver det almindelige lys. UVB er nødvendig.

**FODER**

*T. hoehnelii* er insektæder og tager de fleste insekter af passende størrelse. Giv fårekyllinger, små græshopper, fluer, kakerlaknymfer og andre småinsekter, og hold byttet på højst afstanden mellem dyrets øjne.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**

Arten holdes enkeltvis. Hannerne er meget aggressive over for hinanden og over for lignende arter: de hvæser, puster sig op og bliver sorte, så hanner må ikke kunne se hinanden.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**

Kenya og Uganda.