herpy

KAMÆLEONER

Jacksons kamæleon

Trioceros jacksonii

Trioceros jacksonii er en middelstor kamæleon fra bjergskovene i Kenya og Tanzania. Hannen bærer tre fremadrettede horn, og hunnen føder levende unger i stedet for at lægge æg. Arten kræver kølige nætter, høj nattefugt og en omhyggelig pasning, så den er mest for den øvede holder.

Familie: Chamaeleonidae Engelsk: Jackson's Chameleon Tidligere navn: *Chamaeleo jacksonii; Chamaeleon jacksonii* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-38 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-9 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Hotspot	**27-30 °C**
Temperatur, nat	**10-15 °C**
Luftfugtighed	**40-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Levendefødende**
Kønsmoden	**5-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**8-30 unger**
Drægtighed	**150-180 dage**

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter. Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde). Det er mere end det absolutte minimum på 45 × 45 × 90 cm, men et bedre mål for et dyr, der skal bo der hele livet.

TEMPERATUR
Arten er et højlandsdyr og tåler varme dårligt. Dagtemperaturen i terrariet skal være 20-24 °C. På solpladsen under lampen skal der være 27-30 °C. Tegn på varmestress ses allerede, når hele terrariet kommer over 27 °C.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal følge artens døgnrytme: omkring 90-100 % om natten og 40-50 % om dagen. Konstant 60-80 % er ikke korrekt og kan gøre dyret sygt. Alle overflader skal være tørre i løbet af dagen.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og kræver meget lys. Et T5 HO-rør med 6500 K eller en kraftig LED-lampe over hele terrariets bredde giver lyset. Dagslængden er 12 timer hele året, for Kenya ligger tæt på ækvator. UVB er nødvendig.

FODER
T. jacksonii er insektæder. Byttet må højst være lige så stort som afstanden mellem øjnene. Varier føden: græshopper, fårekyllinger, kakerlaknymfer, fluer og små biller.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten holdes enkeltvis hele livet. Hanner er territoriale og bør aldrig kunne se hinanden. To dyr samles kun, når en hun føres til en han for parring.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Kenya og Tanzania.