herpy

KAMÆLEONER

Johnston's Chameleon

Trioceros johnstoni

Trioceros johnstoni er en middelstor, æglæggende kamæleon fra bjergskovene i Uganda, Rwanda, Burundi og det østlige Congo. Hannen har tre horn, to over øjnene og ét på snuden, og er grøn med turkise eller gule tværbånd; hunnen har ingen horn. Arten kræver en kølig dag, et tydeligt temperaturfald om natten, tåge og høj nattefugt, og den er følsom over for for meget vitamintilskud.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo johnstoni; Chamaeleo laevigularis*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**25-38 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**50-110 g**
Levetid	**5-6 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 120 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-24 °C**
Hotspot	**26-28 °C**
Temperatur, nat	**10-15 °C**
Luftfugtighed	**60-100 %**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 3
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**10-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**8-18 æg**
Kuld pr. år	**1-2**
Inkubation	**100-120 dage** ved 18-21 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 120 cm (længde × bredde × højde). Hannerne bliver store og har gavn af mere bredde. Målet er det samme som for andre middelstore bjergkamæleoner af slægten *Trioceros*.

TEMPERATUR
Om dagen skal der være 20-24 °C, aldrig over stuetemperatur i længere tid, med en solplads på 26-28 °C. Pæren monteres over terrariet og i god afstand, så varmen bliver blid og uden brandfare.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Natten er artens fugtige tid. Luftfugtigheden skal ligge på 80-100 % om natten og falde til 60-80 % om dagen.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv og kræver kraftigt lys. Fire T5 HO-rør med 6500 K over terrariets bredde lyser et 120 cm højt terrarie godt op. Giv 12 timers lys og 12 timers mørke hele året.

FODER
T. johnstoni er insektæder og tager de sædvanlige foderinsekter: fårekyllinger, græshopper, fluer og kakerlakker. Landsnegle er en særlig favorit. Insekterne skal selv have et rigt foder. Unger fodres så meget, som de vil æde.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten holdes enkeltvis. Hannerne må aldrig kunne se hinanden.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Uganda, Rwanda, Burundi og Congo-Kinshasa.