herpy

KAMÆLEONER

Cameroon Two-horned Mountain Chameleon

Trioceros montium

Trioceros montium er en middelstor, grøn kamæleon fra bjergene i Kamerun. Hannen bærer to lange horn på snuden, en høj rygkam og et sejl på halen, mens hunnen er hornløs. Arten lægger æg og kræver meget høj luftfugtighed og en rolig, tæt beplantet opstilling. Den er sjælden i terrariehold og passer bedst til den erfarne holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo montium; Chamaeleo monticum* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-25 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-6 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Regnskov og bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-25 °C**
Hotspot	**29-32 °C**
Temperatur, nat	**15-20 °C**
Luftfugtighed	**80-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6 mdr.**
Kuldstørrelse	**5-25 æg**
Kuld pr. år	**2-3**
Inkubation	**140-160 dage** ved 22-25 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Næsten truet (NT)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som i Danmark udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Om arten

Trioceros montium er en middelstor, træboende kamæleon. Hannen bliver op til 25 cm i alt, inklusive hale, og hunnen op til omkring 20 cm. Hannen bærer to lange horn, der peger lige frem fra snuden, en høj, bølget rygkam og et endnu højere sejl på halen. Hunnen har kun små, kegleformede skæl i stedet for horn og intet halesejl.

Grundfarven spænder fra lysende til mørk skovgrøn eller blålig. Store, pladeformede skæl på kroppen kan være orange, lysegrønne eller himmelblå, og hannen har ofte en gul, blåkantet stribe skråt fra ryggen ned mod bugen. Under opvisning viser hannen blå, limegrønne og gule pletter på hoved og skuldre. En hun med æg bliver mørkere og viser ofte rød hud mellem de grønne skæl. Farverne skifter med humør, temperatur og stress, ikke efter omgivelserne.

Det videnskabelige navn betyder 'bjergenes' og henviser til udbredelsen i Kameruns bjerge. Arten er mindre almindelig i terrariehold end de store *Trioceros*-arter, og pasningsdata er sparsomme. Terriemål, UVB-zone og fodermængder er derfor lånt fra nærtstående bjergarter.

Læs mere: Lys og UVB

Udbredelse og levested

Trioceros montium er endemisk for Kamerun og findes langs den sydlige del af den vulkanske bjergkæde, fra Mount Cameroon til Manengouba-bjergene. Arten er også fundet i Mamfe-distriktet, på Mount Kupe og i Rumpi Hills. Den lever i 600-1.250 m højde, altså på bjergenes lavere og mellemste skråninger frem for på toppene.

> **Oprindelig udbredelse:** Cameroun.

LEVESTED

Arten lever i fugtig skov på bjergskråninger, i vandløbsdale og i tågeskov i lav til middel højde, hvor der falder rigelig nedbør, og hvor skyer og tåge ofte hænger i træerne.

Luftfugtigheden er høj hele døgnet, og nætterne er køligere end dagene. Dyrene sidder i den tætte vegetation og er sky.

Læs mere: Luftfugtighed, sprøjtning og ventilation

Pasning

TERRARIET

Et voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde). Målet er lånt fra andre små til mellemstore bjergkamæleoner af slægten *Trioceros*. Arten holdes enkeltvis, og hanner må ikke kunne se hinanden.

Indret terrariet meget tæt med levende planter, tynde grene og kviste i flere højder, og sørg for godt lys til planterne. Dyrene skal kunne trække sig helt tilbage i bladene. Et hybridterrarie af glas og net giver ventilation og holder samtidig på fugten, og et afløb i bunden fjerner overskydende vand. Bund er ikke nødvendig.

Stillestående luft giver luftvejsinfektioner, så luften skal være i bevægelse, også når fugten er høj.

TEMPERATUR

Dagtemperaturen skal være omkring 22-25 °C, med en solplads på 29-32 °C. Et køligere terrarie med en lille solplads passer bedre end et varmt.

Om natten skal temperaturen falde til 15-20 °C, men højst omkring 10 °C under dagtemperaturen. Tallene passer med dem for den nærtstående *Trioceros quadricornis* fra de samme bjerge: 20-30 °C om dagen, 32 °C på solpladsen og 15-20 °C om natten.

Tjek temperaturen med to termometre i hver sin ende af terrariet.

Læs mere: Varme og temperatur

LUFTFUGTIGHED OG VAND

Meget høj luftfugtighed er afgørende for arten. Fugten skal være op mod 100 %, og dyret skal også om dagen have adgang til vand hele tiden. Tåg terrariet med en ultralydsfugter om natten og tidligt om morgenen, og sprøjt eller dryp morgen og sidst på eftermiddagen, så dyret jævnligt har dråber at drikke.

Arten drikker vanddråber fra bladene, ikke af en skål. Brug destilleret vand i fugteren, og sæt to hygrometre i hver sin ende af terrariet. Grene og blade skal kunne tørre op ind imellem, så der ikke opstår skimmel og sår.

LYS OG UVB

Arten er dagaktiv. Giv 12-13 timers lys om dagen og et kraftigt T5 HO-rør eller en LED over terrariets bredde. Planterne i terrariet kræver også meget lys.

UVB anbefales hele året. Ferguson-zone 2 er lånt fra *Trioceros quadricornis*, en nær slægtning fra de samme bjerge, altså et UV-indeks på højst 1-3 på solpladsen og rigelig skygge. Et UV-meter hjælper. UVB-rør skiftes efter producentens anvisning.

FODER

T. montium er insektæder og en god jæger, der tager de fleste foderinsekter. Giv fårekyllinger, små græshopper, fluer, kakerlaknymfer og andre småinsekter, hvor byttet højst er lige så stort som afstanden mellem dyrets øjne. Lad insekterne gå frit, så dyret jager dem; foderskål frarådes.

Insekterne skal selv have et nærende foder og drysses med kalk. Vitaminer gives sparsomt, for især hannerne er følsomme over for overdosering. Mængderne er lånt fra *Trioceros jacksonii*: unger får føde dagligt, og voksne dyr får 3-8 insekter hver anden dag. Hold dyret slankt, og vej det hver måned.

Læs mere: Foderdyr: hold og avl Læs mere: Kalk, vitaminer og tilskud

ADFÆRD OG HÅNDTERING

Arten holdes enkeltvis. Dyrene er ofte aggressive over for artsfæller, og hunnen skal holdes adskilt fra hannen, til hun er parringsvillig.

Arten er sky. Kommer man for hurtigt eller for tæt på, lader dyret sig ofte falde og løber, bliver sort, slår kolbøtter eller gemmer sig i hjørnerne nær bunden. Den er et udstillingsdyr, ikke et kæledyr, og håndtering skal være kort og sjælden. Mørke farver kan være tegn på kulde, stress eller sygdom.

Vildfangne dyr skal behandles for parasitter. Med den rette behandling og de rette forhold kan arten blive en hårdfør terrariekamæleon.

Læs mere: Køb af dyr: opdræt, vildfang og transport

Avl

KØNSMODENHED OG KØNSBESTEMMELSE

Hannen kendes på de to horn på snuden, den høje rygkam, halesejlet og de klare farver, mens hunnen mangler både horn og sejl. Hunnen er mindre. Kønsmodenheden indtræder efter omkring 6 måneder.

PARRING

Avlen kan være svær, for hannerne er ofte tilbageholdende. Hold hunnen adskilt fra hannen, også uden for synsvidde, og før hende først til hannens terrarie, når hun er parringsvillig. En lidt køligere periode med højere fugt kan få hannen i gang. Skil dyrene ad, når parringen er overstået, eller hunnen afviser hannen.

ÆGLÆGNING OG KULD

Arten lægger æg. Hunnen bliver mørkere, når hun bærer æg, og lægger dem 2-3 måneder efter parringen. Et kuld er på 5-25 æg, og der kan komme 2-3 kuld om året.

Hunnen er ikke kræsen med lægestedet og lægger æggene hvor som helst, så hun skal have en egnet æglægningsbeholder med fugtig jord i terrariet, ellers går æggene let tabt.

INKUBATION

Æggene ruges ved 22-25 °C, gerne omkring 24 °C med et lille fald om natten. Æggene klækker efter omkring 21 uger.

Angivelserne for rugetemperaturen svinger fra 16 til 32 °C, men en mellemtemperatur er det sikreste valg.

OPDRÆT AF UNGER

Ungerne klækker ofte på én gang og har god appetit. Hold dem i et hybridterrarie med samme klima som de voksne, med meget løv og tynde grene. Fodr dem dagligt med små insekter som bananfluer, små fluer og små fårekyllinger, drysset med kalk. Ungerne skilles fra hinanden, når de vokser, og hanner må ikke kunne se hinanden.

Sundhed og typiske fejl

Typiske problemer og fejl i pasningen:

- Dehydrering ved for lav luftfugtighed og for få drikkemuligheder.
- Indvoldsparasitter hos vildfangne dyr.
- Luftvejsinfektioner ved stillestående luft eller for våde overflader.
- Knoglesvind (MBD) ved for lidt UVB eller kalk.
- Overdosering af vitaminer, især hos hanner.
- Sår og skimmel af grene, der er våde hele tiden.
- Æg, der går tabt eller holdes tilbage, hvis hunnen ikke har et egnet lægested.

Levetiden er ikke dokumenteret; 4-6 år er et skøn. Vej dyret hver måned. Kontakt en dyrlæge med erfaring i krybdyr ved ophørt fødeindtagelse, mørk farve, slaphed eller åndedrætsbesvær.

Læs mere: Typiske sygdomme og tegn på sygdom

Spørg altid dine kloge bekendte

Vejledningen er et godt sted at begynde, men den kan ikke erstatte erfaring. Dyr er forskellige, og meget af det vigtigste lærer man af dem, der har holdt arten i årevis. Tal med en avler, en erfaren holder eller en dyrlæge med forstand på krybdyr og padder, før du anskaffer dyret - og igen, hvis noget ser forkert ud.