herpy

KAMÆLEONER

Four-horned Chameleon

Trioceros quadricornis

Trioceros quadricornis er en middelstor kamæleon fra de kølige bjergskove i Cameroun og det sydøstlige Nigeria. Hannen bærer flere horn på snuden og en høj sejlkam på ryggen. Arten er sky, tåler varme og tørhed dårligt, og mange dyr i handlen er vildfangne, så den er for den erfarne holder.

Familie: Chamaeleonidae Tidligere navn: *Chamaeleo quadricornis; Chamaeleo eisentrauti; Trioceros eisentrauti* Udgivet 16. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**20-37 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**3-7 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Bjergskov**
Sværhedsgrad	**Erfaren**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 90 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**20-25 °C**
Temperatur, nat	**13-18 °C**
Luftfugtighed	**50-100 %**
UVB	**Anbefalet** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6 mdr.**
Kuldstørrelse	**8-15 æg**
Kuld pr. år	**2-4**
Inkubation	**120-150 dage** ved 20-23 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Appendiks II**
EU-bilag	**Bilag B**
IUCN	**Sårbar (VU)**

Arten står på CITES liste II og i EU's bilag B (forordning 338/97), som alle kamæleoner af slægten *Trioceros*. Handel over grænser kræver derfor CITES- og EU-dokumenter, som udstedes af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV). Spørg sælger om dokumentation for dyrets herkomst. Ingen kamæleoner er forbudt for private i Danmark (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), så de almindelige regler gælder.

Pasning i korte træk

TERRARIET
Et voksent dyr skal have et netterrarie på mindst 60 × 60 × 90 cm (længde × bredde × højde), og gerne op til 120 cm højt. Større er altid bedre.

TEMPERATUR
Arten er en køligkrævende bjergart. Dagtemperaturen skal være 20-25 °C, og 22-25 °C er ideelt. Om natten skal temperaturen falde omkring 5 °C til 13-18 °C, og den må ikke holdes oppe med lamper eller varmemåtter.

LUFTFUGTIGHED OG VAND
Luftfugtigheden skal være mindst 50 % og helst 70 % eller mere om dagen og stige mod 100 % om natten. Er fugten vedvarende lav, tørrer dyret ud og får nyre- og luftvejssygdomme.

LYS OG UVB
Arten er dagaktiv. UVB-lysstofrør er det bedste hovedlys, og en lille glødepære er nok som solplads. Naturligt sollys uden glas er en stor fordel, for almindeligt vinduesglas filtrerer UVB fra.

FODER
Trioceros quadricornis er insektæder. Giv så varieret føde som muligt: små møl, fluer, snegle, bænkebidere, fårekyllinger og superorme. Møl, fluer og snegle bliver sjældent afvist. Fedtrige voksmøllarver gives kun sparsomt.

ADFÆRD OG HÅNDTERING
Arten holdes enkeltvis. Samhusning giver stress, og hunner kan dø af luftvejsinfektion eller holde op med at æde. Arten er sky og trækker sig tilbage, og den håndteres så lidt som muligt.

OPRINDELIG UDBREDELSE
Cameroun og Nigeria.