herpy

LEGUANER

Green Anole

Anolis carolinensis

Anolis carolinensis er en slank, klatrende øgle fra det sydøstlige USA, der skifter mellem grøn og brun efter temperatur, lys og humør. Den bliver 12-20 cm inklusive hale, er dagaktiv og lever af små insekter. Den kræver et højt, lyst og fugtigt terrarie med UVB og en varm solplads, og hannen holdes alene eller sammen med et par hunner.

Familie: Dactyloidae Tidligere navn: *Ameiua bullaris; Anolis baccatus; Anolis podargicus; Anolius carolinensis; Norops baccatus* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**12-20 cm** total længde inkl. hale
Vægt	**2-6 g**
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende**
Biotop	**Tempereret skov og eng**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 60 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**22-28 °C**
Hotspot	**30-35 °C**
Temperatur, nat	**18-24 °C**
Luftfugtighed	**60-70 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**4-12 mdr.**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Kuld pr. år	**6-10**
Inkubation	**35-49 dage** ved 28-30 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen anoler eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	En enkelt anole skal have et terrarie på mindst 60 × 60 × 60 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, især i højden, fordi arten klatrer og bruger hele rummet.
TEMPERATUR	Solpladsen skal være 30-35 °C målt på grenen lige under varmelampen. Resten af terrariet holdes på 22-28 °C om dagen, og om natten er 18-24 °C passende.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal ligge på 60-70 % i gennemsnit, lavere midt på dagen og højere om natten. Sprøjt planterne morgen og aften, så dyret kan drikke dråberne fra bladene.
LYS OG UVB	Arten er dagaktiv og skal have kraftigt lys og UVB hver dag. Den soler sig i halvskygge, og UVB-lampen skal give Ferguson-zone 2, dvs. et UV-indeks på højst omkring 3 på solpladsen.
FODER	*Anolis carolinensis* er insektæder og tager levende bytte, der bevæger sig.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Hannerne er territoriale og viser sig ved at nikke med hovedet, folde hudlappen ud og puste sig op. To hanner i samme terrarie kæmper, og den svageste tager skade eller bukker under af stress.
OPRINDELIG UDBREDELSE	USA.