herpy

LEGUANER

Common Puerto Rican Anole

Anolis cristatellus

Anolis cristatellus er en kraftig, dagaktiv anole fra Puerto Rico og Jomfruøerne. Hannen har en høj, finnelignende kam på halen, som altid står oprejst, og en gulgrøn hudlap med en orangerød kant, som den folder ud under nik og armstrækninger. Arten lever på stammer og i lav højde, er territorial og meget sky, og den kræver UVB, levende foder og et terrarie med både grene og bund.

Familie: Dactyloidae Tidligere navn: *Anolis cozumelae; Anolis lindeni; Ctenonotus cristatellus*

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**15-20 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**4-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende og jordboende**
Biotop	**Tørskov og regnskov**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**60 × 45 × 60 cm** L × B × H til 1 voksent dyr
Temperatur, dag	**26-29 °C**
Hotspot	**32-35 °C**
Temperatur, nat	**20-24 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vandskål**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter**
Holdes	**Enkeltvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kuldstørrelse	**1-2 æg**
Inkubation	**45-55 dage** ved 26-28 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D og er ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Den står heller ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Der findes kun lidt viden om pasningen af *Anolis cristatellus*. Tallene for temperatur, fugt, lys og inkubation er lånt fra *Anolis sagrei* og *Anolis carolinensis*, som holdes meget mere og har næsten samme krav.
TEMPERATUR	Luften skal holde 26-29 °C om dagen, og solpladsen skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C målt med et infrarødt termometer. Den køligere side er 24-26 °C. Om natten er 20-24 °C passende.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-80 %: lavere midt på dagen og højere om natten.
LYS OG UVB	*Anolis cristatellus* er dagaktiv og skal have UVB hver dag for at danne D3 og optage kalk. UVB-lampen skal give Ferguson-zone 2, dvs. et moderat UV-indeks på solpladsen.
FODER	Arten er insektæder og tager levende byttedyr, der bevæger sig: fårekyllinger, kakerlakker (fx dubia og discoider), græshopper, silkeorme, hornorme, små superorme og larver af soldaterfluer.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky, hurtig og ikke et dyr til håndtering. Den kan tabe halen, og den gror ikke ud igen i samme form.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Puerto Rico, De Amerikanske Jomfruøer og De Britiske Jomfruøer.