herpy

LEGUANER

## Brown Anole

# *Anolis sagrei*

*Anolis sagrei* er en lille, hurtig og jordnær anole fra Cuba, Bahamas og Mellemamerikas østkyst. Hannen er brun med en gul til dybrød hudlap under struben og forsvarer sit område ved at nikke og løfte og sænke forkroppen. Arten er hårdfør og dagaktiv, men meget sky, og den kræver UVB, levende foder og et terrarie med både grene og bund at løbe på.

Familie: Dactyloidae  Tidligere navn: *Anolis sagrae; Norops sagrei; Anolis ordinatus; Anolis greyi*

### SPECIFIKATIONER

#### DYRET

| | |
|---|---|
| Voksenstørrelse | **13-22 cm**<br>total længde inkl. hale |
| Levetid | **4-8 år** |
| Aktiv | **Dag** |
| Levevis | **Træboende og jordboende** |
| Biotop | **Tørskov og regnskov** |
| Sværhedsgrad | **Øvet** |

#### PASNING

| | |
|---|---|
| Min. terrarie | **60 × 45 × 60 cm**<br>L × B × H til 1 voksent dyr |
| Temperatur, dag | **26-29 °C** |
| Hotspot | **32-35 °C** |
| Temperatur, nat | **20-24 °C** |
| Luftfugtighed | **60-80 %** |
| Vand | **Vandskål** |
| UVB | **Nødvendig**<br>Ferguson-zone 2 |
| Kost | **Insekter** |
| Holdes | **Enkeltvis eller 1 han med flere hunner** |

#### AVL

| | |
|---|---|
| Formering | **Æglæggende** |
| Kønsmoden | **9-12 mdr.** |
| Kuldstørrelse | **1-2 æg** |
| Kuld pr. år | **15-18** |
| Inkubation | **28-56 dage**<br>ved 26-28 °C |

#### BESKYTTELSE OG PAPIRER

| | |
|---|---|
| CITES | **Ikke omfattet** |
| EU-bilag | **Ikke omfattet** |
| IUCN | **Ikke truet (LC)** |

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D og er ikke på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015). Den står heller ikke på EU's liste over invasive arter.

## Pasning i korte træk

**TERRARIET**
Et enkelt voksent dyr skal have et terrarie på mindst 60 × 45 × 60 cm (længde × bredde × højde). Større er bedre, og et terrarie på 60 × 60 × 90 cm giver langt mere at bruge uden meget større fodaftryk.

**TEMPERATUR**
Luften skal holde 26-29 °C om dagen, og solpladsen skal have en overfladetemperatur på 32-35 °C målt med et infrarødt termometer. Den køligere side er 24-26 °C. Om natten er 20-24 °C passende.

**LUFTFUGTIGHED OG VAND**
Luftfugtigheden skal være 60-80 %: lavere midt på dagen og højere om natten.

**LYS OG UVB**
*Anolis sagrei* er dagaktiv og skal have UVB hver dag for at danne D3 og optage kalk. UVB-lampen skal give Ferguson-zone 2, dvs. et UV-indeks på højst omkring 3 på solpladsen.

**FODER**
Arten er insektæder og tager levende byttedyr, der bevæger sig: fårekyllinger, kakerlakker (fx dubia og discoider), græshopper, silkeorme, hornorme, små superorme og larver af soldaterfluer.

**ADFÆRD OG HÅNDTERING**
Arten er sky, hurtig og ikke et dyr til håndtering. Opdrættede dyr falder bedre til end vildfangne. Er du nødt til at tage dyret op, så gør det roligt og kort; arten kan tabe halen, og den gror ikke ud igen i samme form.

**OPRINDELIG UDBREDELSE**
Cuba, Bahamas, Caymanøerne, Jamaica, Mexico, Belize, Guatemala og Honduras.