herpy

LEGUANER

Brown Basilisk

Basiliscus vittatus

Basiliscus vittatus er en hurtig, langbenet øgle fra vandkanter i Mexico og Mellemamerika, kendt for at løbe på to ben hen over vandet. Hannen bliver op til 60 cm inklusive hale og bærer en stor hovedkam. Arten er dagaktiv, lever mest af insekter og kræver et højt, fugtigt terrarie med UVB, en varm solplads og en vanddel.

Familie: Corytophanidae Tidligere navn: *Cristasaurus mitrella; Dactylocalotes elisa* Udgivet 17. november 2026

SPECIFIKATIONER

DYRET

Voksenstørrelse	**35-60 cm** total længde inkl. hale
Levetid	**5-8 år**
Aktiv	**Dag**
Levevis	**Træboende, jordboende og semi-akvatisk**
Biotop	**Tørskov, regnskov og vådområde**
Sværhedsgrad	**Øvet**

PASNING

Min. terrarie	**90 × 90 × 120 cm** L × B × H til 2 voksne dyr
Temperatur, dag	**25-30 °C**
Hotspot	**35-40 °C**
Temperatur, nat	**23-26 °C**
Luftfugtighed	**60-80 %**
Vand	**Vanddel**
UVB	**Nødvendig** Ferguson-zone 2
Kost	**Insekter, frugt og hvirveldyr**
Holdes	**Enkeltvis, parvis eller 1 han med flere hunner**

AVL

Formering	**Æglæggende**
Kønsmoden	**6-15 mdr.**
Kuldstørrelse	**2-18 æg**
Kuld pr. år	**1-5**
Inkubation	**55-70 dage** ved 28-31 °C

BESKYTTELSE OG PAPIRER

CITES	**Ikke omfattet**
EU-bilag	**Ikke omfattet**
IUCN	**Ikke truet (LC)**

Arten står hverken på CITES-listerne eller i EU's bilag A-D. Ingen basilisker eller andre arter i gruppen står på den danske liste over dyr, som private ikke må holde (bekendtgørelse nr. 1261 af 17.11.2015), og arten er ikke på EU's liste over invasive arter.

Pasning i korte træk

TERRARIET	Et par eller en han med to hunner skal have et højt terrarie på mindst 90 × 90 × 120 cm (længde × bredde × højde), og større er bedre.
TEMPERATUR	Luften skal holde 25-30 °C om dagen, og solpladsen skal have en overfladetemperatur på 35-40 °C målt med et infrarødt termometer. Om natten er 23-26 °C passende. Tallene er de samme for de tre almindelige basilisker.
LUFTFUGTIGHED OG VAND	Luftfugtigheden skal være 60-80 %. Sprøjt terrariet og løvet 1-2 gange dagligt, eller brug et tåge- eller regnanlæg på timer, og mål med et hygrometer.
VAND OG VANDKVALITET	Dyret bader og bruger tid i vandet, og vanddelen skal være stor nok til, at hele dyret kan ligge i den. Et filtreret vandkar eller et vandfald holder vandet rent og hæver fugten.
LYS OG UVB	*Basiliscus vittatus* er dagaktiv og skal have UVB hele dagen for at danne D3 og optage kalk.
FODER	*Basiliscus vittatus* lever mest af insekter og andre leddyr, men tager også nedfaldne bær, og ældre dyr æder mere plantekost. Giv fårekyllinger, græshopper, kakerlakker, superorme og edderkopper, og kun af og til voksorme.
ADFÆRD OG HÅNDTERING	Arten er sky, hurtig og stresset ved håndtering. Dyr, der tages op, flygter eller bider. Tages et dyr op, skal det ske roligt og kun, når det er nødvendigt. Arten er et dyr at iagttage, ikke et dyr at holde i hænderne.
OPRINDELIG UDBREDELSE	Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica og Panama.